

ENROFLOXACINA 20%
BROMHEXINA HCl 1.5%

ENROCAL PLUS

ANTIBIÓTICO Uso Oral



TU FINCA **SANA** CON  **CALBOS**

www.calbosvenezuela.com



ENROFLOXACINA 20%
BROMHEXINA HCl 1.5%

**ENROCAL
PLUS**

SUSPENSIÓN DE USO ORAL

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contienen:

Enrofloxacin (Sustancia activa) 20.0 g
Bromhexina Hcl 1.5 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

PROPIEDADES

Al combinar un antibiótico de amplio espectro como (**Enrofloxacin al 20%**) con un expectorante mucolítico como la (**Bromhexina al 1.5%**), se produce un efecto de sinergia farmacocinética, no solo actúan por separado, sino que la **Bromhexina** modifica la dinámica del antibiótico para hacerlo más efectivo en el sistema respiratorio.

ESPECIES ANIMALES

Producto Destinado a:



Porcinos • Aves

INDICACIONES DE USO

PORCINOS (Cerdos). Se utiliza principalmente en: Neumonía enzoótica, Pleuroneumonía, Rinitis atrófica, Diarreas bacterianas.

AVES (de Corral). Se utiliza principalmente en: Coriza infecciosa, *Mycoplasma* (CRD), Colibacilosis, Cólera aviar, Salmonella.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Aplicar en el agua de bebida.



PORCINOS (Cerdos)

Administrar 1ml de **ENROCAL PLUS** por cada 20 kg de peso vivo, diluir en el agua de bebida.



AVES (de Corral)

Administrar 0.5 ml a 1 ml de **ENROCAL PLUS** por cada litro de agua de bebida.

ANTIBIÓTICO • **ENROCAL PLUS** Enrofloxacin 20% + Bromhexina 1.5%



ENROFLOXACINA 20%
BROMHEXINA HCl 1.5%

**ENROCAL
PLUS**

BENEFICIOS CLÍNICOS POR COMPONENTE

✓ ENROFLOXACINA

Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal (biodisponibilidad >80%).

Es altamente lipofílica, lo que le permite cruzar membranas celulares fácilmente.

Se metaboliza parcialmente en el hígado transformándose en **Ciprofloxacina**.

✓ BROMHEXINA

Al ser administrada por vía oral, su absorción es rápida.

Actúa como **agente de transporte** aumentando la permeabilidad de las barreras bronquiales.

La **Bromhexina** logra que la **Enrofloxacin**a alcance concentraciones en el **tejido pulmonar y secreciones bronquiales** mucho más altas (hasta 2 o 3 veces más) que si se administrara el antibiótico solo.

- **Más rápida:** El alivio respiratorio es casi inmediato por la acción mucolítica.
- **Más profunda:** El antibiótico llega a lugares del pulmón donde hay flemas espesas.

DOSIS RECOMENDADA:

- 10 mg de Enrofloxacin/kg de peso vivo.
- Se administra una vez al día durante tres días consecutivos.
- En el caso de Salmonelosis se recomienda 5 días.
- El agua medicada deberá prepararse cada día de tratamiento.
- Utilizar agua potable. Agitar antes de usar.

Proceder de la siguiente manera:

- A. Calcular la cantidad de **ENROCAL PLUS** necesaria para el total de kilos de peso vivo por cerdos.
- B. Calcular la cantidad de agua consumida diariamente por las aves a tratar;
- C. Diluir todo el volumen del medicamento en 1/4 del volumen de agua de bebida consumida diariamente por el lote de cerdos o por las parvadas.
- D. Esperar a que los animales consuman el total del agua medicada;
- E. Durante el resto del día administrar el agua sin medicar.



ENROFLOXACINA 20%
BROMHEXINA HCl 1.5%

**ENROCAL
PLUS**



VENTAJAS COMPETITIVAS

✓ MAYOR PENETRACIÓN Y CONCENTRACIÓN ANTIBIÓTICA

La **Bromhexina** actúa como un agente mucolítico que rompe la viscosidad del moco en el tracto respiratorio, lo que facilita que la **Enrofloxacin** penetre más rápido y en mayores concentraciones en los tejidos pulmonares, linfáticos y secreciones bronquiales.

✓ ACCIÓN RÁPIDA E INTEGRAL

El efecto expectorante de la **Bromhexina** reduce la dificultad respiratoria (tos, estertores) en los animales, logrando una recuperación más rápida.

✓ ADMINISTRACIÓN CONVENIENTE

La formulación suele ser ideal para administración en agua de bebida (solución oral), facilitando el tratamiento de grandes parvadas o lotes de cerdos, reduciendo el estrés de manejo.

PRESENTACIONES Y CONSERVACIÓN

PRESENTACIONES:

100 ml - 250 ml y 1 Litro.

CONSERVACIÓN:

- Mantener en un lugar fresco (entre 15 °C y 30 °C) seco y protegido de la luz solar.
- El agua medicada solo es efectiva por 24 horas. Pasado ese tiempo, la **Enrofloxacin** pierde su capacidad bactericida y la **Bromhexina** se asienta.
- Debes tirar el sobrante del día anterior, lavar el bebedero y preparar **mezcla nueva** cada mañana.
- Guardar en un sitio cerrado para evitar que la humedad afecte el sello del frasco o la estabilidad de la fórmula oral.

ANTIBIÓTICO • **ENROCAL PLUS** Enrofloxacin 20% + Bromhexina 1.5%

ENROFLOXACINA 20%
BROMHEXINA HCl 1.5%

ENROCAL PLUS

ANTIBIÓTICO

Uso Oral



TU
FINCA
SANA
CON


CALBOS
Salud Animal

SÍGUENOS:  @calbosvzla www.calbosvenezuela.com

Producto para Cerdos y Aves del

GRUPO
Supply Vet

