

ENROFLOXACINA 30%

ENROCAL

POLVO 30%

ANTIBIÓTICO

Uso Oral



TU FINCA **SANA** CON  **CALBOS**

www.calbosvenezuela.com

ENROFLOXACINA 30%

ENROCAL
POLVO 30%



POLVO DE USO ORAL

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contienen:

Enrofloxacin (Sustancia activa) 30.0 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

PROPIEDADES

ENROCAL POLVO es una fluoroquinolona de tercera generación, su acción bactericida corresponde a los antibióticos de amplio espectro contra gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos.

La **Enrofloxacin** actúa bloqueando la síntesis del ácido nucleico bacteriano.

ESPECIES ANIMALES

Producto Destinado a:



Bovinos • Ovinos • Caprinos • Porcinos • Aves

INDICACIONES DE USO

BOVINOS • OVINOS • CAPRINOS

- **Enfermedades Digestivas:** Diarreas y Colibacilosis.
- **Infecciones Respiratorias:** Neumonías.
- **Infecciones Sistémicas o de Piel.**

PORCINOS (Cerdos)

- **Complejo Respiratorio Porcino:**
Trata la **Pleuroneumonía** (*Actinobacillus pleuropneumoniae*) y la Rinitis Atrófica.
- **Diarreas Neonatales y Post-destete:**
Efectivo contra colibacilosis y salmonelosis porcina.
- **Síndrome Mastitis-Metritis-Agalactia (MMA):**
En cerdas adultas, ayuda a controlar infecciones uterinas y de ubre tras el parto.

AVES (Pollos de engorde, Pavos, Patos y Gansos)

Es el uso más común para controlar brotes masivos en galpones.

- **Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC):**
Ataca al *Mycoplasma gallisepticum*, eliminando el "ronquido" y la inflamación de sacos aéreos.
- **Coriza Infecciosa:**
Reduce la secreción nasal y la hinchazón de la cara (*Avibacterium paragallinarum*).
- **Colibacilosis:**
Controla la mortalidad por *E. coli* (diarrea blanca y onfalitis en pollitos).
- **Cólera Aviar:**
Tratamiento contra *Pasteurella multocida*.



ENROFLOXACINA 30%
ENROCAL
POLVO 30%

BENEFICIOS CLÍNICOS

✓ **POTENCIA BACTERICIDA DE "CHOQUE"**

Mata directamente a las bacterias al destruir su ADN. Esto permite una **recuperación visible del animal en las primeras 24 a 48 horas de tratamiento.**

✓ **DOBLE POTENCIA**

Una vez ingerido, el animal transforma parte de la **Enrofloxacin** en **Ciprofloxacina**.

Esto significa que el animal cuenta con dos antibióticos potentes circulando en su sistema simultáneamente, lo que refuerza el éxito del tratamiento.

✓ **FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN METAFILÁCTICA**

El **ENROCAL POLVO al 30%**, permite medicar a grandes poblaciones de animales a través del agua de bebida.



DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral. Aplicar en el agua de bebida.



BOVINOS • OVINOS • CAPRINOS:

0,3 g cada **20 kg** de peso vivo equivalente a **5 mg/kg** de peso vivo de **ENROCAL POLVO al 30%**.



PORCINOS (Cerdos):

0,15 g cada **20 kg** de peso vivo equivalente a **2,5 mg a 5 mg/kg** de peso vivo de **ENROCAL POLVO al 30%**, durante 3 días.



AVES (Pollos de engorde, Pavos, Patos y Gansos):

5 mg/kg de peso vivo de **ENROCAL POLVO al 30%**, durante 3 a 5 días.

ENROFLOXACINA 30%

ENROCAL
POLVO 30%



VENTAJAS COMPETITIVAS

✓ **ALTA CONCENTRACIÓN (30%)**

Al ser una formulación concentrada, permite administrar dosis menores en volumen, lo que facilita la aplicación, reduce el estrés en el animal durante la inyección y disminuye la cantidad de producto necesario para tratar grandes grupos.

✓ **AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN**

Actúa eficazmente contra bacterias Gram-negativas, Gram-positivas y micoplasmas, siendo particularmente eficaz en infecciones respiratorias, digestivas y genitourinarias.

✓ **EXCELENTE FARMACOCINÉTICA Y BIODISPONIBILIDAD**

La **Enrofloxacin**a se absorbe rápidamente y se distribuye ampliamente en los tejidos y fluidos corporales, alcanzando concentraciones más altas en los tejidos que en el plasma.

TIEMPO DE RETIRO

BOVINOS • OVINOS • CAPRINOS • CERDOS:
7 a 10 días.

AVES:
5 a 7 días.

PRESENTACIONES Y CONSERVACIÓN

PRESENTACIONES: BOLSAS DE 100 g y 250 g.

CONSERVACIÓN:

- Debe conservarse en un lugar fresco, idealmente entre 15 °C y 30 °C.
- Debe mantenerse en un lugar seco para evitar que se apelmace o forme grumos que alteren la dosificación exacta.
- El envase debe estar protegido de la luz directa. La **Enrofloxacin**a es fotosensible; la exposición a los rayos UV puede provocar su oxidación y pérdida de eficacia.
- Mantener lejos de niños y animales domésticos, puede causar toxicidad.
- Asegurar que el agua medicada sea la única fuente de bebida y renovarla cada 24 horas.

ENROFLOXACINA 30%
ENROCAL
POLVO 30%

ANTIBIÓTICO
Uso Oral



SÍGUENOS:  @calbosvzla www.calbosvenezuela.com

Producto para Grandes Animales y Aves del

GRUPO
Supply Vet

