TU FINCA SANA CON CALBOS Saúde Animal

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

www.calbosvenezuela.com

ÍNDICE DE CATEGORÍAS Y PRODUCTOS

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES:
CALBIÓTICO . . . 3
DIAZIL . . . 3
PENCIL PRONTO . . . 4
OXITETRA VILAVET . . . 4
CALBOFUR PLUS . . . 5
CALBOTYL 200 . . . 6
DIHIDRO CAL . . . 7
DRAXCAL . . . 8

ANTIBIÓTICOS INTRAMAMARIOS:
MASTICAL . . . 9
NEOMASTIC . . . 9

ANTIBIÓTICOS ORALES:
TILCAL ORAL . . . 10
ENROCAL ORAL . . . 11
ENROCAL PLUS . . . 12
ENROCAL POLVO 30% . . . 13
OXICAL POLVO 20% . . . 14

ANTIDIARREICO:
STOP ANTIDIARREICO . . . 15

ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS INYECTABLES:
DICLOFENACO CALBOS . . . 16
FLUNICAL . . . 16
DEX-CAL . . . 17
BUTA-CAL . . . 18

ANESTÉSICO Y PRE-ANESTÉSICO:
XILACAL . . . 19

COCCIDICIDAS:
CALBOCOX . . . 20
CALBOCOX AVIAR 2.5% . . . 21

CÓLICO Y TIMPANISMO:
SEDACOL . . . 22

CUIDADO DEL TRACTO DIGESTIVO:
GASTROCAL . . . 23

ANTIPARASITARIOS INYECTABLES:
ABAMECTINA . . . 24
FORTMISOL . . . 24
IVERMIN . . . 25
TAITEC . . . 25
CALBOMAX . . . 26
MOXICAL . . . 27
RAFOCAL . . . 28
RICOFORT . . . 29
IVERMIN GOLD 3,15% . . . 30

AGENTES ANTIHEMOTRÓPICOS:
PIROSAN 7% . . . 31
CALBIZOL . . . 32

MATAGUSANOS:
MATA BICHEIRA CALBOS . . . 33

ANTIPARASITARIOS ORALES:
HIPOFEN . . . 34
ENDOSTAC . . . 34
IVERMIN PASTA ORAL . . . 35
EQUIMOX GOLD . . . 36
CALBENDAZOLE 10% . . . 37
TAITEC ORAL . . . 37
CLOZACAL . . . 38

TRATAMIENTOS HORMONALES:
PLACENCAL . . . 39
SINCRONIZE . . . 39
CALDIOL . . . 40
CIPIOCAL . . . 41
REPROGEST . . . 42
INTRAGEST 0.6 . . . 43
INTRAGEST 1.38 . . . 43
REPROCAL 5000 . . . 44

ECTOPARASITICIDAS POUR-ON:
CIPERMETRINA 6% POUR-ON . . . 45
DOUBLE KILL POUR-ON . . . 46

ECTOPARASITICIDAS BAÑOS POR ASPERSIÓN:
AMITRAZ BAÑO POR ASPERSIÓN . . . 47
GADO LIMPO BAÑO POR ASPERSIÓN . . . 48
CIPERFON BAÑO POR ASPERSIÓN . . . 49

ANTICOLINÉRGICO | PARASIMPATICOLÍTICO:
ATROPINA CALBOS 1% . . . 50

SUPLEMENTOS Y RECONSTITUYENTES INYECTABLES:
BOVIFORT EXP . . . 51
CALFOZ . . . 52
FERRON B-12 . . . 52
VIT ADE . . . 53
CALBOS COMPLEX SEL . . . 54
FOSFOSEL MINERAL . . . 55 y 56
YODA-CAL . . . 57
CALVITASAN PLUS . . . 58

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE USO ORAL MULTIESPECIE:
ADE CALBOV . . . 59
ADE PHÓS CALBOV . . . 59
ALLIUM . . . 60

SUPLEMENTOS ORALES PARA AVES Y CERDOS:
PATA NEGRA . . . 61
CARIJÓ . . . 62
FARINHA DE CÁLCIO AVÍCOLA . . . 63

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE USO ORAL CON PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS:
BOVIFORT LEITE . . . 64
BOVIFORT CORTE . . . 65
BOVIFORT PROBIÓTICO PASTA ORAL . . . 66
PROLIFE EQUI . . . 67

SOLUCIÓN ENERGÉTICA:
GLICOCALBOS 50 . . . 68

POMADA PARA UBRES:
POMADA DE ORDEÑO CALBOS . . . 69

DESTINADO A:

Bovinos · Equinos · Ovinos · Caprinos · Porcinos

PRESENTACIÓN
CAJA CON
25 Frascos-Ampollas con Polvo
25 Ampollas con Diluyente

CALBIÓTICO

ANTIMICROBIANO INYECTABLE PARA BOVINOS
ANTIBIÓTICO CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN

- Es de acción prolongada.
- Asociación de 3 Penicilinas + Estreptomicina.
- Tratamiento adecuado para el animal adulto.
- Acción antiinflamatoria que asegura una rápida mejoría del animal.

COMPOSICIÓN

Cada Frasco-Ampolla con Polvo contiene:	
Benzilpenicilina Procaína	3.000.000 UI
Benzilpenicilina Potásica	1.500.000 UI
Benzilpenicilina Benzatina	1.500.000 UI
Estreptomicina (Sulfato)	2,400 g
Cada Ampolla con Diluyente contiene:	
Diclofenaco Sódico	375 mg
Agua para Inyectable c.s.p.	15 ml

DOSIS
Bovinos: 5-8 ml/100 kg peso vivo equivalentes a 8.000 UI-24.000UI/kg de peso vivo vía intramuscular como dosis única, si es necesario aplicar otra dosis a las 72 horas. El producto debe ser reconstituido al momento del uso, agitar la suspensión antes de la aplicación del medicamento y aplicar volúmenes de acuerdo al peso corporal del animal.

PROPIEDADES
Antimicrobiano con amplio espectro de acción. Se trata de una combinación de cuatro antibióticos: Benzilpenicilina G Procaína, Potásica y Benzatina (eficaz contra Bacterias Gram(+) y Estreptomicina Sulfato (eficaz contra Bacteria Gram(-)).
Se indica en las infecciones bacterianas que afectan el ganado, caballos, ovejas, porcinos y cabras. En su composición se agrega diclofenaco sódico, antiinflamatorio no esteroideo, que favorece la recuperación del animal debido a su función analgésica y antiinflamatoria. Es indicado en la profilaxis de infecciones bacterianas sensibles a los activos de la formulación en: castración, antes y después de intervenciones quirúrgicas.
TIEMPO DE RETIRO Carne: 44 días. **Leche:** 7 días.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
50 ml y 100 ml

DIAZIL

ANTIBIÓTICO PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES BACTERIANAS

- Aplicación intramuscular profunda.
- Antimicrobiano de amplio espectro.
- Ampliamente utilizado como bactericida en el ganado bovino.
- Indicado para la prevención y control de infecciones del ganado.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:	
Sulfadiazina	40,0 g
Trimetoprim	8,0 g
Agua para Inyección c.s.p.	100,0 ml

DOSIS
Bovinos: 13,5 mg -2,7 mg de la asociación Sulfadiazina — Trimetoprim / kg de peso vivo / día (equivalente a 1 ml del producto/ 30 kg de peso vivo). Aplicar cada 24 horas durante 5 días consecutivos. Mantener el tratamiento hasta 48 horas después de los síntomas.

INDICACIONES
Está indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas en bovinos, causadas por *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus agalactiae,* sensibles a Sulfadiazina y Trimetoprim como: Infecciones Respiratorias: neumonía y bronquitis. Infecciones Digestivas: diarrea, colibacilosis. Infecciones Genitales: vaginitis, metritis, abortos infecciosos y como preventivo de infecciones después del parto. Infecciones Urinarias: cistitis, uretritis y nefritis. Otras Infecciones: herida en el casco, mastitis, heridas infecciosas, septicemia y como prevención de infecciones postquirúrgicas. **TIEMPO DE RETIRO Carne:** 24 días. **Leche:** 13 días.

DESTINADO A:

Bovinos Equinos

PRESENTACIÓN
FRASCO AMPOLLA
25 ml - 50 ml y 100 ml

PENCIL PRONTO

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO LISTO PARA SU USO

- Alta concentración de Penicilina Procaína.
- Contiene **Piroxicam,** Antiinflamatorio que facilita la acción del antibiótico.
- Acción inmediata.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Penicilina G Procaína	20.000.000 UI
Dihidroestreptomicina (Sulfato)	8 g
Piroxicam	0,60 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

DOSIS
Bovinos y Equinos: 1 ml para cada 20 kg de peso corporal, correspondiente a 10.000 UI de Penicilina G Procaína, 4 mg de Sulfato de Dihidroestreptomicina y 0,3 mg de Piroxicam para cada kg de peso corporal. Intervalo entre dosis: El tratamiento deberá ser repetido cada 24 horas, por 3 a 5 días, hasta 48 horas después de los síntomas.

PROPIEDADES Es un antibiótico con amplio espectro de acción debido a la asociación de dos antibióticos: Penicilina G Procaína (eficaz contra Bacterias Gram-Positivas) y Dihidroestreptomicina Sulfato (eficaz contra las Bacterias Gram-Negativas). El producto también incluye en su composición el Piroxicam, antiinflamatorio no esteroideo que favorece la recuperación del animal enfermo, debido a su acción analgésica y antiinflamatoria. **TIEMPO DE RETIRO Carne:** 34 días. **Leche:** 12 días.

DESTINADO A:

Bovinos Ovinos Caprinos

Porcinos Conejos

PRESENTACIÓN
FRASCO AMPOLLA
100 ml y 200 ml

OXITETRA VILAVET

SOLUCIÓN INYECTABLE - ANTIBIÓTICO DE LARGA ACCIÓN (LA) DE AMPLIO ESPECTRO A BASE DE OXITETRACICLINA CON ANESTÉSICO LOCAL - LISTO PARA USAR

- Dosis única. • Larga acción. • Con anestésico local.
- Altamente activo contra microorganismos Gram Positivos y Gram Negativos.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina (Clorhidrato)	20,00 g
Lidocaína (Clorhidrato)	0,20 g
Vehículos c.s.p.	100 ml

DOSIS Aplicar vía intramuscular profunda o subcutánea, cada 48-72 horas.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.
No aplique más de 10 ml en el mismo punto de inyección.
Dosis máxima = 30 ml por vía intramuscular profunda o subcutánea, cada 48-72 horas.
Porcinos: En lechones de hasta 10 kg aplicar 1 ml.
A los animales de más de 10 kg se les aplica 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.
No aplique más de 5 ml en el mismo punto de inyección.
Dosis máxima = 10 ml por vía intramuscular profunda o subcutánea, cada 48-72 horas.

INDICACIONES Es indicada para el tratamiento de la Anaplasmosis (ocasionada por *Anaplasma marginale),* de Queratoconjuntivitis Infecciosa "Oftalmia Infecciosa" *(Moraxella bovis y Moraxella capri),* de la Leptospirosis bovina "Enfermedad Hemorrágica de los Becerros" *(Leptospira* sp), de la Pleuropneumonia *(Haemophilus pleuropneumoniae),* de la Dermatofitosis *(Dermathophilus congolensis),* de las Micoplasmosis *(Mycoplasma* sp), de la Enteritis Bacteriana *(Escherichia coli).*

TIEMPO DE RETIRO Carne: Bovinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos - Conejos: 30 días.
Leche: Bovinos - Ovinos - Caprinos: No usar.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
SUSPENSIÓN INYECTABLE
100 ml

CALBOFUR *plus*

¡FÓRMULA INNOVADORA, ÚNICA EN EL MERCADO!

- Antibiótico betalactámico (Cefalosporina de tercera generación) en combinación con antiinflamatorio no esteroideo.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Ceftiofur. HCl *	5,35 g
Ketoprofeno	15,0 g

(*) Equivalentes a 5 g de Ceftiofur Base.

INDICACIONES
El producto combina un antibiótico de amplio espectro (Cefalosporina de Tercera Generación) con un Antiinflamatorio No Esteroideo, indicado para el tratamiento y control de enfermedades producidas por gérmenes Gram (+) y Gram (-) susceptibles en los cuales además se necesite alivio de los procesos inflamatorios presentes.

Enfermedad respiratoria bovina, fiebre de embarque, neumonías, necrobacilosis interdigital aguda, pododermitis, metritis, etc.

Entre otros microorganismos susceptibles: *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Histophilus somni (Haemophilus somnus), Pasteurella multocida, Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., *Haemophilus pleuropneumoniae, Fusobacterium necrophorum* y *Bacterioides* spp., etc.

El tratamiento debe ser realizado bajo prescripción profesional.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Agitar bien el producto antes de usar.
Parenteral: por vía intramuscular o subcutánea, con las medidas de asepsia correspondientes a la administración de inyectables.

DOSIS
Cada ml contiene:
150 mg de Ketoprofeno y 50 mg de Ceftiofur.

1 ml cada 50 kg de peso, equivalente a 1 mg/kg de Ceftiofur y 3 mg/kg de Ketoprofeno, por día, durante 3 – 5 días.

No administrar más de 10 ml por punto de inoculación.

TIEMPO DE RETIRO
Carne: 0 días.
Leche: 0 días.

DESTINADO A:

Bovinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos
Caninos
Felinos
Aves

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
100 ml y 250 ml

CALBOTYL 200

TYLOSINA

- Antimicrobiano de amplio espectro listo para usar.
- Indicado en el tratamiento de enfermedades ocasionadas por gérmenes susceptibles a la Tylosina.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Tylosina base	20 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Para el control y tratamiento de infecciones causadas por gérmenes Gram Positivos Aeróbicas y Anaeróbicas y algunos gérmenes Gram Negativos, Micoplasmas, Clamidias y Rickettsias, con localización en aparato respiratorio, tracto urinario, gastrointestinal, reproductivo, glándula mamaria, piel, etc.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Parenteral: Inyectable Intramuscular.

DOSIS
Aves: Aplicar 25 mg / kg de peso.

Porcinos: Aplicar 10 a 20 mg / kg vía intramuscular / cada 24 horas / por 3 días.

Bovinos, Ovinos y Caprinos: Aplicar vía intramuscular, 5 a 10 mg / kg de peso vivo/ cada 24 horas / por 5 días.

Caninos y Felinos: 10 mg / kg / 2 veces al día.

TIEMPO DE RETIRO
Aves:
Pollos, Gallinas y Pavos: 5 días después de la última aplicación.

Bovinos:
Carne: 21 a 30 días.

Porcinos: 14 días.

Ovinos y Caprinos: 21 a 30 días.

Cuando la leche se destine al consumo humano, no utilizarla hasta pasados 5 días del último tratamiento.

DESTINADO A:

Bovinos
Ovinos
Equinos
Porcinos
Caprinos
Caninos
Aves

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
250 ml y 500 ml

DIHIDRO CAL

DIHIDROESTREPTOMICINA

- Dihidroestreptomicina 50 mg / ml solución inyectable.
- Para el control de infecciones producidas por agentes infecciosos sensibles a la Dihidroestreptomicina.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Dihidroestreptomicina (sulfato)	50 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

INDICACIONES

Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos, Equinos y Aves.

Bovinos: Leptospirosis, Colibacilosis, Neumoenteritis, Pasteurelosis, Salmonelosis.
Porcinos: Leptospirosis, Neumonía, Salmonelosis, Septicemia.
Ovinos y Caprinos: Aborto paratífico, Pasteurelosis.
Equinos: Aborto Paratífico, Pasteurelosis, Septicemia.
Caninos: Leptospirosis.
Aves: Coriza Infecciosa, Cólera Aviar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía intramuscular profunda.

Bovinos y Porcinos: 1 ml / 10 kg p.v. (50 mg Dihidroestreptomicina / kg p.v.), en dosis única.

Equinos, Ovinos y Caprinos: 0,5 ml / 10 kg p.v. / día, durante 3 días.

Caninos: 0,1 ml / kg p.v. (50 mg de Dihidroestreptomicina / kg p.v.) / día, durante 3 días.

Aves: Pollos, gallinas, pavos; 50 a 100 mg / kg p.v. del producto diluido 1:10 ó 1:20 con agua para inyección, en dosis única.

PRECAUCIONES DE USO

Administrar con precaución en animales con historial de alergias.
Vigilar la función renal durante el tratamiento, sobre todo en animales jóvenes.
Evitar tratamientos prolongados, sobre todo en carnívoros.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 30 días.
Leche: 2 días.

DESTINADO A:

Bovinos **Porcinos**

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
50 ml y 100 ml

DRAXCAL

TULATROMICINA 10%

- Tratamiento y prevención de las Enfermedades Respiratorias (ERB y del Complejo Respiratorio Porcino (CRP).

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Tulatromicina	10,0 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES
DRAXCAL es un antibiótico de amplio espectro contra patógenos Gram-negativos y Gram-positivos. Se caracteriza por su rápido desarrollo de acción prolongada, actuando específicamente sobre los tejidos del sistema respiratorio bovino y porcino.

INDICACIONES DE USO
En Bovinos: Tratamiento de las enfermedades respiratorias (ERB), especialmente las asociadas *Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida* y *Mycoplasma Bovis.*
En Porcinos: Tratamiento del complejo respiratorio porcino (CRP), asociado a patógenos como *Actinobacillus pleuropneumoniae* (APP), *Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis* y *Mycoplasma hyopneumoniae.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía subcutánea en Bovinos. Vía intramuscular en Porcinos.

DOSIS
Bovinos: 1 ml de **DRAXCAL** por cada 40 kg de peso corporal.
Pocinos: 1 ml de **DRAXCAL** por cada 40 kg de peso corporal.
Se recomienda administrar una sola dosis | DOSIS ÚNICA.

BENEFICIOS CLÍNICOS
Tulatromicina
Es un agente antimicrobiano macrólido semisintético, gracias a la estructura química única de la Tulatromicina su diseño de triamilida le otorga ventajas prácticas que se traducen en rentabilidad.

CONSERVACIÓN
Mantener en lugar fresco (entre 15 °C y 30 °C), seco y protegido de la luz solar.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
CAJA CON
12 Jeringas de 10 ml c/u

MASTICAL

SOLUCIÓN ANTIMICROBIANA,
ANTIINFLAMATORIA Y ANTIFÚNGICA INTRAMAMARIA

- Fórmula exclusiva.
- Uso en vacas lactantes.
- El único con Nistatina.
- Uso en Mastitis causadas por Hongos y Bacterias.

COMPOSICIÓN	**Cada JERINGA contiene:**
Sulfadiazina	500 mg
Nistatina (150.000 UI)	26,05 mg
Prednisolona	5,00 mg
Vehículo c.s.p.	10 ml

DOSIS
- Desinfectar los pezones y ubre o lavar cuidadosamente con agua y jabón.
- Enjuagar con toallas de papel limpias. Sacar el máximo de leche de la ubre.
- Remover el dispositivo sellado de la jeringa y cánula con protector.
- Introducir la cánula en el pezón inyectando todo el contenido de la jeringa.
- Retirar con cuidado la cánula y masajear para facilitar la difusión del producto.
- Repetir el tratamiento hasta 3 días después de la cura o a criterio del Médico Veterinario. Utilizar el contenido de una jeringa para cada pezón.

Nota: Ordeñar el animal después de 6 horas de la aplicación del producto.

PROPIEDADES
Asociación de tres principios activos con funciones específicas: antifúngico, antimicrobiano y antiinflamatorio. Actúa en mastitis producidas por hongos y bacterias. Además posee una excelente acción antiinflamatoria. La Nistatina actúa como fungistático y como fungicida. Está indicado en la terapia de las micosis superficiales de piel y mucosas. La Sulfadiazina es un antimicrobiano que interfiere en la vía metabólica de las bacterias en diferentes etapas. La Prednisolona es un corticosteroide útil para tratar un amplio rango de inflamaciones.
TIEMPO DE RETIRO Carne: 7 días. **Leche:** 72 horas.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
CAJA CON
12 Jeringas de 8 ml c/u

NEOMASTIC

SUSPENSIÓN ANTIBIÓTICA INTRAMAMARIA
PARA LAS VACAS EN EL INICIO DEL PERÍODO SECO

- El paso adelante para una lactancia saludable.
- Para las vacas en el período seco.
- Acción prolongada.

COMPOSICIÓN	**Cada JERINGA contiene:**
Sulfato de Neomicina	400 mg
Bacitracina de Zinc	5.000 UI
Vehículo c.s.p.	8 ml

DOSIS
Aplicar el contenido de una jeringa (8 ml) para cada cuarto mamario y luego el completo secado y desinfección externa. Se aplica el producto efectuando el último ordeño antes del inicio del período seco de las vacas.

PROPIEDADES
Antibiótico en forma de suspensión para las vacas en el inicio del período seco.
Es una combinación de antibióticos sinérgicos de gran actividad sobre gérmenes resistentes a otros fármacos. El amplio espectro antimicrobiano del producto actúa sobre los principales gérmenes que causan mastitis.
TIEMPO DE RETIRO Carne: 30 días. **Leche:** 3 días.

DESTINADO A:

Porcinos **Aves**

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN ORAL
250 ml

TILCAL ORAL

TILMICOSINA 25%

- Antibiótico de amplio espectro contra Micoplasmas.
- Tratamiento y Prevención en Masa (Metafilaxia)..

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Timilcosina Fosfato (Sustancia activa)	25.0 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES
TILCAL ORAL es un antibiótico macrólido de amplio espectro, para tratar enfermedades respiratorias en porcinos y aves.
Es especialmente eficaz contra bacterias Gram-positivas, algunas Gram-negativas y, de manera muy destacada, contra *Mycoplasmas*.

INDICACIONES DE USO
Aves de corral (Pollos de engorde y Pollitas): Es una de las herramientas más potentes para el control de enfermedades que afectan el rendimiento del lote:
• Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC): Tratamiento y control de infecciones causadas por *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae* (ronquera).
• Infecciones Secundarias: Control de brotes de *Ornithobacterium rhinotracheale* y complicaciones por *Pasteurella multocida* (Cólera aviar).
• Afecciones Digestivas: En algunos casos se indica para el control de enteritis necrótica por *Clostridium perfringens.*

Porcinos (Cerdos): Se utiliza principalmente en las etapas de transición y engorde para reducir la mortalidad por neumonías:
• Neumonía Enzoótica: Causada por *Mycoplasma hyopneumoniae.*
• Pleuroneumonía Porcina: Tratamiento de cuadros agudos causados por *Actinobacillus pleuropneumoniae.*
• Complejo Respiratorio Porcino (CRP): Infecciones asociadas a *Pasteurella multocida* y *Haemophilus parasuis.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Vía oral, en el agua de bebida.
Aves de corral (Pollos de engorde y Pollitas): Mezclar 0.3 ml de **TILCAL ORAL** para un litro de agua potable de bebida por 3 días consecutivos.
Porcinos (Cerdos): Mezclar 0.8 ml de **TILCAL ORAL** para un litro de agua potable de bebida por 5 días consecutivos.

CONSERVACIÓN
- Mantener en un lugar fresco y seco, a temperatura entre 15 °C y 30 °C.
- Mantener el frasco bien cerrado para protegerlo de la humedad ambiental.
- El agua no consumida después de 24 horas debe ser desechada y reemplazada por una mezcla fresca para asegurar que la concentración terapéutica sea la correcta.

ENROCAL ORAL

ENROFLOXACINA 20%

- Antimicrobiano de amplio espectro.
- Tratamiento y control de infecciones respiratorias, urinarias, intestinales y cutáneas.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Enrofloxacina	20.0 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Antibiótico bactericida. Para el tratamiento y control de infecciones respiratorias, urinarias, intestinales y cutáneas producidas por gérmenes Gram positivos, Gram negativos y *Mycoplasma (Haemophilus* spp.; *Pasteurella* spp.; *Escherichia Coli; Staphylococcus* spp.; *Streptococcus* spp.; *Clostridium* spp.; *Proteus* spp.; *Salmonella* spp.; *Bordetella* spp.; *Campylobacter* spp.; *Corynebacterium* spp.; *Bacillus* spp.; *Erysipelotrix* spp.; *Fusobacterium* spp.; *Klebsiella* spp.; *Listeria* spp.; *Moraxella* spp.; *Serratia* spp.; *Shigella* spp.; *Yersinia* spp.; *Vibrio* spp.).

No se debe usar como tratamiento preventivo aplicado en los alimentos o en el agua en ausencia de signos clínicos en el animal tratado o en los animales tratados con el producto.
El producto no debe usarse como primer tratamiento a menos que este justificado, cuando se emplea como segundo tratamiento, en teoría deberá hacerse sobre la base de los resultados de pruebas bacteriológicas.

DESTINADO A:

Bovinos · Ovinos · Porcinos · Aves

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN ORAL
100 ml - 250 ml y 1 Litro

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Por vía oral, a través del agua de bebida, leche, leche de reemplazo o sustituto lácteo.
Aves: Mezclar **ENROCAL ORAL** según la dosis indicada en el agua de bebida que consumirán los animales en 24 horas. Por seguridad y bienestar de los animales, se debe cambiar la cantidad de agua cada 24 horas. Se recomienda una dosis de 10 mg de producto por kg de peso vivo y por día (1 ml cada 20 kg de peso vivo).

DOSIS
50 ppm, equivalentes a 100 ml del producto en 400 litros de agua.
Prolongar el tratamiento por 3 días, en caso de Salmonelosis por 5 días.

Bovinos, ovinos y porcinos: Mezclar **ENROCAL ORAL** en el agua de bebida, leche de reemplazo o sustituto de la leche, a razón de 2,5 mg a 5 mg por kg de peso vivo (0,5 a 1 ml de **ENROCAL ORAL** cada 40 kg de peso vivo). Cada 24 horas durante 3 a 5 días. En todos los casos deberá prevalecer el juicio del Médico Veterinario a cargo.

RESTRICCIONES DE USO
Aves, Bovinos, Porcinos y Ovinos: No enviar a faena hasta transcurrir 7 días desde el último tratamiento. No administrar a ponedoras que se encuentren en producción de huevos para consumo humano. No administrar a animales en producción láctea para consumo.

ENROCAL PLUS

DESTINADO A:

Porcinos **Aves**

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN ORAL

100 ml - 250 ml y 1 Litro

ANTIMICROBIANO

- Tratamiento de procesos infecciosos respiratorios primarios y secundarios en aves y cerdos.
- Combinación de una fluoroquinolona y un mucolítico para administración oral.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Enrofloxacina (Sustancia activa)	20,0 g
Bromhexina Hcl	1,5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES

Al combinar un antibiótico de amplio espectro como (Enrofloxacina al 20%) con un expectorante mucolítico como la (Bromhexina al 1.5%), se produce un efecto de sinergia farmacocinética, no solo actúan por separado, sino que la Bromhexina modifica la dinámica del antibiótico para hacerlo más efectivo en el sistema respiratorio.

INDICACIONES DE USO

Para Cerdos en casos de Neumonía enzoótica, Pleuroneumonía, Rinitis atrófica, Diarreas bacterianas. Para Aves en caso de Coriza infecciosa, Mycoplasma (CRD), Colibacilosis, Cólera aviar, Salmonella. Para administración oral en el agua de bebida.
Porcinos (Cerdos): Se utiliza principalmente en: Neumonía enzoótica, Pleuroneumonía, Rinitis atrófica, Diarreas bacterianas.
Aves (de Corral): Se utiliza principalmente en: Coriza infecciosa, *Mycoplasma* (CRD), Colibacilosis, Cólera aviar, Salmonella.

DOSIS

Vía oral. Aplicar en el agua de bebida.
La dosis recomendada es 10 mg de **ENROCAL PLUS** / kg de peso vivo, una vez al día durante tres días consecutivos. En el caso de salmonelosis se recomienda 5 días.

PORCINOS (Cerdos): Mezclar **ENROCAL PLUS** según la dosis indicada por kg de peso vivo en el agua de la bebida, leche de reemplazo o sustituto de la leche, a razón de 2,5 a 5 mg por kg de peso vivo (0,5 a 1 ml de **ENROCAL PLUS 20% ORAL** cada 40 kg de peso vivo), cada 24 horas, durante 3 a 5 días. En todos los casos deberá prevalecer el juicio del Médico Veterinario a cargo.

DESTINADO A:

Bovinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos
Aves

PRESENTACIÓN
BOLSAS DE POLVO ORAL
100 g y 250 g

ENROCAL
POLVO 30%

ENROFLOXACINA 30%

- Alta Concentración (30%).
- Amplio Espectro de Acción.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Enrofloxacina (Sustancia activa)	30.0 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES
ENROCAL POLVO es una fluoroquinolona de tercera generación, su acción bactericida corresponde a los antibióticos de amplio espectro contra gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos. La Enrofloxacina actúa bloqueando la síntesis del ácido nucleico bacteriano.

INDICACIONES
Bovinos, Ovinos y Caprinos: Enfermedades Digestivas (Diarreas y Calibacilosis).
Infecciones Respiratorias: Neumanías. Infecciones Sistemicas o de Piel.
Porcinos (Cerdos): Complejo Respiratorio Porcino: Trata la Pleuroneumonía *(Actinobacillus pleuropneumoniae)* y la Rinitis Atrófica.
Diarreas Neonatales y Post-destete: Efectivo contra colibacilosis y salmonelosis porcina.
Síndrome Mastitis-Metritis-Agalactia (MMA): En cerdas adultas ayuda a controlar infecciones uterinas y de ubre tras el parto.
Aves (Pollos de engorde, Pavos, Patos, Gansos): Es el uso más común para controlar brotes masivos en galpones.
Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC): Ataca al *Mycoplasma gallisepticum,* eliminando el "ronquido" y la inflamación de sacos aéreos.
Coriza Infecciosa: Reduce la secreción nasal y la hinchazón de la cara *(Avibacterium paragallinarum).*
Colibacilosis: Controla la mortalidad por *E. coli* (diarrea blanca y onfalitis en pollitos).
Cólera Aviar: Tratamiento contra *Pasteurella multocida.*

DOSIFICACIÓN
Bovinos, Ovinos y Caprinos: 0,3 g cada 20 kg de peso vivo equivalente a 5 mg/kg de peso vivo.

Porcinos (Cerdos): 0.15 g cada 20 kg de peso vivo equivalente a 2.5 mg / kg de peso vivo.

Aves de Corral (Pollos de engorde, Pavos, Patos, Gansos): 5 mg/kg de peso vivo.

VÍA DE APLICACIÓN
Vía oral. Aplicar en el agua de bebida.

TIEMPO DE RETIRO
Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: 7 a 10 días.
Aves de Corral (Pollos de engorde, Pavos, Patos, Gansos): 5 a 7 días.

OXICAL
20% POLVO

OXITETRACICLINA 20%

- Alta Concentración (20%).
- Amplio Espectro de Acción.

COMPOSICIÓN
Cada 100 g contiene:

Oxitetraciclina HCl	20 g
Excipientes c.s.p.	100 g

INDICACIONES
Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento y profilaxis de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos Gram +; Gram -; Chlamydiae; Mycoplasma; Ricketsiae y algunos hongos.

Indicado en enfermedades infecciosas del aparato respiratorio y digestivo (Colibacilosis, Salmonelosis, Neumonía, Bronconeumonía, Micoplasmosis, Colienterotoxemia, diarrea de los lechones, Rinitis atrófica, neumonía enzoótica, síndrome Metritis – Mastitis – Agalactia); en las siguientes especies: Bovinos, ovinos, suinos (porcinos), aves (pollos engorde, pavos, patos, gansos, etc.); equinos, conejos y camélidos.

DOSIFICACIÓN
200 g a 500 g por tonelada de ración.

Posología sugerida:
Mezclado en la ración:
Preventivo: 500 g por tonelada.
Curativo: 1000 g por tonelada.

En el agua de bebida:
Preventivo: 1500 g cada 1000 L de agua.
Curativo 3000 g cada 1000 L de agua de bebida.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía oral. En agua de bebida o en la ración.

Preparar la mezcla ya sea en el agua de bebida o en la ración acorde a las dosis indicadas. En caso de administrarse en el agua de bebida se debe calcular la dosis acorde al consumo estimado de agua diaria de los animales. Se recomienda utilizar agua potable. Agitar el producto antes de usar. Esperar que los animales consuman el total de agua medicada. Descartar la mezcla sobrante.

DESTINADO A:

Bovinos
Ovinos
Porcinos
Aves
Equinos
Conejos
Camélidos

PRESENTACIÓN
BOLSAS DE POLVO ORAL
100 g - 250 g
500 g y 1 kg

DESTINADO A:

Bovinos **Equinos**
Ovinos **Caprinos**
Aves **Caninos**
Felinos **Porcinos**

PRESENTACIÓN
CAJA CON
10 Sobres de 10 g c/u

STOP ANTIDIARREICO

ANTIDIARREICO DE POTENTE ACCIÓN CONTRA LAS BACTERIAS

- Contiene Pectina (ayuda en la protección gastrointestinal).
- Bactericida y Bacteriostático.
- Facilidad en la aplicación.
- Asociación consagrada.

COMPOSICIÓN
Cada 10 mg contiene:

Sulfametoxazol	1,00 g
Trimetoprim	0,08 g
Pectina	1,80 g
Excipiente c.s.p.	10,00 g

DOSIS
Aviar, Caninos y Felinos: 1 sobre para cada 100 kg de peso vivo (100 mg/kg).

Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: 1 sobre para cada 142 kg de peso vivo (70 mg/kg). Administrar en intervalos de 24 horas y mantener el tratamiento hasta 48 horas después de cesar los síntomas clínicos, o a criterio del Médico Veterinario.

El tratamiento no debe exceder 7 días. Puede ser mezclado con la ración, o disuelto en agua de bebida o leche, cuidar para que el animal ingiera la cantidad total de la dosis en cada toma.

Diluir el contenido del sobre (10 g) en la cantidad de líquido (agua o leche) que el técnico o veterinario tratante considere correlativo al peso corporal del animal o animales a tratar.

Ejemplo: Si diluimos un sobre de **Stop Antidiarreico** (10 g) en 50 ml de líquido (agua/leche), nos alcanzaría para tratar un becerro de 142 kg esto para una sola dosis, o tratar a 28 lechones de 5 kg como dosis diaria administrando 1,8 ml por lechón, pero en el caso de un canino de 20 kg ésta misma dilución nos alcanzaría para 5 dosis; o sea, 5 días de tratamiento administrándole 10 ml diarios.

PROPIEDADES
La asociación sinérgica del Sulfametoxazol y del Trimetoprim es un importante avance en el desarrollo de medicamentos antimicrobianos, clínicamente efectivos.

TIEMPO DE RETIRO
Caprinos - Ovinos - Porcinos:
Carne: 42 días.
Leche: 11 días.

Aves productoras de carne: 24 días.
Aves ponedoras: 11 días.

DESTINADO A:

Bovinos · Equinos · Ovinos · Caprinos · Porcinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
50 ml y 100 ml

DICLOFENACO CALBOS

ANTIINFLAMATORIO, ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO NO ESTEROIDAL (AINE) - INYECTABLE

- Sustancia no esteroidea.
- Con potente acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética.
- Recomendable para todos los casos de dolor, fiebre y/o inflamación.
- Tratamiento auxiliar en infecciones y dolor agudo causado por cirugía y heridas.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Diclofenaco Sódico	5,00 g
Vehículo c.s.p.	100,00 ml

DOSIS
Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: 1 ml para cada 50 kg de peso vivo por día. El tratamiento podrá ser repetido por 3 a 5 días. Generalmente una única inyección es efectiva.

PROPIEDADES
Es una solución inyectable de diclofenaco sódico, indicado para el tratamiento de: Diarrea en los recién nacidos, Mastitis aguda, Desórdenes musculoesqueléticos, Paresia posparto (Res Caída). Tratamiento auxiliar en infecciones agudas, para reducir la fiebre, estimular el apetito, dolor agudo causado por cirugía y heridas, procesos inflamatorios del aparato locomotor, síndromes dolorosos de la columna vertebral y neuritis de orígenes diversos; auxilio en el alivio de dolores viscerales o calambres. Tratamientos sintomáticos de enfermedades respiratorias, gastroenteritis colibacilares neonatales, hinchazón mamaria, posparto y artropatías diversas. Síndrome Metritis-Mastitis-Agalactia (MMA); entre otros.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 10 días. **Leche:** 3 días.

DESTINADO A:

Bovinos · Equinos · Ovinos · Caprinos · Porcinos · Caninos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
50 ml y 100 ml

FLUNICAL

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO (AINE), ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO CON EFECTO ANTIENDOTÓXICO

- En cuadros inflamatorios asociados a procesos infecciosos.
- En la inflamación del aparato locomotor y musculoesquelético.
- Alivio del dolor asociado al Síndrome de Abdomen Agudo (SAA) y Cólicos.

COMPOSICIÓN **Cada 100 ml contiene:**

Flumixina Meglumina	8,30 g*
Excipientes c.s.p.	100 ml

(*) Equivalentes a 50 mg por ml de Flumixina.

DOSIS
Equinos: 1 - 2,2 mg / kg por día, administrada cada 8 a 12 horas, durante 3 días. Mantiene el efecto antiendotóxico a la dosis de 0,25 mg/kg cada 8 horas.
En cólicos si reaparecen los síntomas, consulte a su Médico Veterinario sin demora, dado que puede necesitar tratamiento quirúrgico.
Bovinos: 1,1 - 2,2 mg/kg por día, o repartida en 2 ó 3 veces en el día durante 3 días.
Porcinos: 1 - 2 mg/kg.
Ovinos y Caprinos: 1,1 - 2 mg/kg por día.
Caninos: 1 - 2 mg/kg por día durante 3 días. Con 1 ml de producto a la dosis de 1,1 mg/kg de peso vivo, se está dosificando para 45 kg de peso animal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Parenteral, por vía inyectable IV (preferentemente) o IM.

TIEMPO DE RETIRO Carne: Bovinos - Ovinos - Caprinos: 7 días. Porcinos: 20 días.
Leche: 5 días.

DESTINADO A:

Bovinos **Equinos**

Ovinos **Caprinos**

Caninos **Felinos**

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
100 ml

DEX-CAL

DEXAMETASONA BASE 0,2%

¡ANTIINFLAMATORIO!

- Glucocorticoide utilizado en el tratamiento de enfermedades metabólicas y procesos inflamatorios en general.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Dexametasona Base	0,2 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Es utilizado como tratamiento primario o complementario de dermatitis, urticaria, bursitis, tendinitis, artritis, shock anafiláctico, mastitis, reacciones de hipersensibilidad, cetosis, síndromes neurológicos postraumatismos y otros cuadros que responden a la administración de corticosteroides.
Salvo en casos de emergencia, no utilizar en pacientes con nefritis crónica e hiperadrenocorticalismo (Síndrome de Cushing).
En perros se ha observado polidipsia, polifagia y poliuria tras la administración de glucocorticoides.
Cuando los glucocorticoides son administrados a animales jóvenes durante períodos de tiempo prolongados, pueden retrasar o desfavorecer el crecimiento.
Usar con precaución en caso de Diabetes, Osteoporosis o Insuficiencia Cardiaca Congestiva.

IMPORTANTE: La administración de corticosteroides en gestación avanzada puede desencadenar parto prematuro con distocia, muerte fetal, retención de placenta y metritis.

Nota: Se recomienda no aplicar en hembras gestantes ya que puede producir anormalidades fetales, partos prematuros o abortos, excepto indicación de un profesional para la inducción del parto en bovinos y ovinos.

El tratamiento debe ser realizado bajo prescripción profesional.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Parenteral: Por vía IM, SC o IV, con las medidas de asepsia correspondientes a la aplicación de inyectables. Cada ml del producto provee 2 mg de Dexametasona.

DOSIS
Recomendada como antiinflamatorio:
Bovinos, ovinos y caprinos: 5 - 20 mg (2,5 - 10 ml).
Equinos: 2,5 - 5 mg (1,25 - 2,5 ml).
Caninos: 0,25 - 1 mg (0,12 - 0,5 ml).
Felinos: 0,125 - 0,5 mg (0,06 - 0,25 ml).

La dosis puede aumentarse y/o repetirse según criterio del Profesional actuante de acuerdo al efecto deseado, el cuadro clínico, la especie y categoría del animal a tratar.

TIEMPO DE RETIRO
Carne: 5 días.
Leche: 5 días.

DESTINADO A:

Equinos

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE

100 ml

BUTA - CAL

¡FENILBUTAZONA!

• Analgésico • Antiinflamatorio • Antipirético.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Fenilbutazona	20 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES

Para el tratamiento y prevención de afecciones inflamatorias asociadas al sistema musculoesquelético, como Artritis, Bursitis, Miositis, Tendinitis, Tendovaginitis (inflamación de la brida o vaina que rodea al tendón), Neuritis, Laminitis.

Patologías dolorosas tales como: Luxaciones, lesiones musculares.

Equinos: Tratamiento de Artritis o Artrosis crónicas, Bursitis y reacciones en tejidos blandos; como agente antirreumático.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO

Parenteral: Por vía intravenosa lenta.
Causa gran irritación cuando es administrada fuera de la vena, por lo que se recomienda especial precaución al administrar el medicamento.

DOSIS

Posología recomendada: 10 ml por día durante 5 días o acorde al Profesional actuante.

Equinos: 2 a 8 mg/kg. p.v. total diarios, vía intravenosa lenta.

TIEMPO DE RETIRO

No aplica.

DESTINADO A:

Equinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
20 ml y 50 ml

XILACAL

XILACINA 10%

SEDANTE • ANESTÉSICO • PREANESTÉSICO

COMPOSICIÓN

HCl de Xilacina	11,65 g
(Equivalente a 10.0 g de Xilacina base)	
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
La Xilacina está indicada para provocar en los equinos sedación, con un corto período de analgesia y como preanestésico no narcótico antes de la anestesia local o general.

Usos: Procedimientos de diagnóstico, ortopédicos, dentales, en cirugía menor de corta duración, sedante durante el período postquirúrgico, para facilitar el manejo de animales irascibles.
Como preanestésico cuando se utiliza pentobarbital sódico, tiopental sódico, tiamilal sódico, óxido nitroso, halotano o metoxiflurano.

DOSIS
Cada ml de Xilacal contiene 100 mg de Xilacina base.
Por vía endovenosa: 0,5 ml de Xilacal para cada 50 kg de peso (1,1 mg de Xilacina / kg de peso).
Por vía intramuscular: 1 ml de Xilacal para cada 50 kg de peso (2,2 mg de Xilacina / kg de peso).
Luego de su administración, se debe permitir que el animal descanse en un ambiente tranquilo hasta total efecto.
Las dosis indicadas proveen un efecto de sedación por aproximadamente 1 – 2 horas y analgesia por unos 15 – 30 minutos.
Cuando es utilizado como preanestésico en anestesia general, habitualmente es suficiente para alcanzar el plano anestésico quirúrgico, el uso de 1/3 a 1/2 de la dosis total calculada de barbitúricos administrada a efecto.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Intramuscular o intravenosa, con las medidas de asepsia correspondientes a la aplicación de inyectables.

Advertencias
Los equinos tratados pueden excitarse y patear ante diferentes estímulos, sobre todo auditivos, sea cauteloso en el manejo de estos animales.
Evite la inyección intraarterial que puede causar convulsiones y colapso.

SOBREDOSIS:
Signos: Arritmias cardíacas, hipotensión y profunda depresión respiratoria y del SNC.

El tratamiento: para la sobredosis o para acortar el tiempo de recuperación, es el uso de Yohimbina o Antipamezol.

Para disminuir los efectos depresivos respiratorios aplicar soporte mecánico de la función respiratoria y estimulantes respiratorios como el Doxapram.

DESTINADO A:

Bovinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos
Caninos
Felinos

PRESENTACIÓN
SUSPENSIÓN ORAL
250 ml y 1 Litro

CALBOCOX

COCCIDICIDA

- Efectivo para el tratamiento y control contra todas las especies de *Eimeria* spp.
- Ejerce un efecto coccidicida en todos los estadios de desarrollo intracelular de la Coccidia, como son la Esquizogonia y la Gametogonia.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Toltrazuril	5.0 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES

El Toltrazuril es un fármaco coccidiostático derivado de las triazinas que es empleado en medicina veterinaria para tratar enfermedades provocadas por Coccidios.
Coccidicida efectivo para el tratamiento y control de la coccidiosis causada por: *Eimeria bovis, Eimeria zuernii* y *Eimeria alabamensis* en Bovinos, por *Isospora suis* en Porcino y por *Eimeria crandallis* y *Eimeria ovinoidalis* en Ovinos.
Ejerce un efecto coccidicida en todos los estadios de desarrollo intracelular de la Coccidia, como son la Esquizogonia y la Gametogonia.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO

Administración oral directa.
Agitar bien antes de usar.

DOSIS

Bovinos: Dosis única oral de 15 mg por kg de peso vivo, en la práctica 3 ml por 10 kg de peso vivo. Para obtener un mayor beneficio, los animales deben ser tratados antes de presentar los signos clínicos.

Porcinos: Cada Lechón debe ser tratado en el día 3-5 de vida con una dosis única oral de 20 mg / kg de p/v. En la práctica corresponde a 0.4 ml / kg de peso corporal.
Los tratamientos durante los períodos de enfermedad pueden ser limitados para el lechón debido al daño ya ocurrido en el intestino delgado.

Ovinos y Caprinos: Dosis única oral de 20 mg por kg de peso vivo. En la práctica corresponde a 0.4 ml / kg de peso vivo; para obtener un mayor beneficio, los animales deben ser tratados antes de presentar los síntomas clínicos.

Caninos: Dosis vía oral de 20 mg por kg de peso vivo, lo que equivale en la práctica a 0.4 ml / kg de peso vivo.

Felinos: Dosis vía oral de 10 mg por kg de peso vivo, lo que equivale en la práctica a 0.2 ml / kg de peso vivo.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 77 días.
Leche: No se permite su uso en animales productores de leche para el consumo humano.

CALBOCOX AVIAR 2.5%

DESTINADO A:

Aves

PRESENTACIÓN

SUSPENSIÓN ORAL

100 ml - 250 ml y 1 Litro

COCCIDICIDA DE AMPLIO ESPECTRO PARA AVES

- Prevención, control y tratamiento de infecciones causadas por coccidias en aves.
- Indicado en pollos de engorde, pollos de levante, reproductores, pavos, pollitas y pollonas.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Toltrazuril	2.5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES

Para la prevención, control y tratamiento de infecciones causadas por coccidias en aves.

Agentes etiológicos susceptibles:

En pollos de engorde, pollitas y pollonas: *Eimeria tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. brunetti, E. máxima, E. mitis, E. meleagrimitis, E. adenoides.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en agua de bebida. El producto debe disolverse en agua potable. Agitar bien.
Se recomienda el uso de guantes para la preparación del producto.
Lavarse las manos con agua y jabón luego de manipular el producto.

DOSIS

La dosis recomendada es de 7 mg / kg de peso vivo.
Esta dosis se alcanza diluyendo 1 litro del producto por cada 1000 litros de agua de bebida o 1 ml del producto por cada litro de agua de bebida (25 ppm).
Se administra durante dos días consecutivos.

Cuando la administración sea con periodos de 8 horas de tratamiento en ambos días, la dosificación será de 3 ml por litro de agua (75 ppm).
Se deben asegurar las condiciones de luz total durante el tratamiento, manteniéndose la alimentación durante el mismo.
Agregue la cantidad de producto necesaria a la cantidad de agua que se consumirá en 8 horas y agite muy bien.
Es necesario la eliminación de otras fuentes de agua de bebida durante las horas de tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO

No enviar a faena las aves tratadas hasta pasados los 18 días de la última dosificación, en pavos el período de espera es de 28 días.

CONTRAINDICACIONES

No debe administrarse a ponedoras, ni a pollas de levante después de las 16 semanas.

PRECAUCIONES

Conservar en su envase original, mantener en lugares secos, lejos de la luz solar, mantener la temperatura dentro de los límites establecidos para la conservación del producto. Nunca volver a utilizar los envases vacíos, descartar envases y sobrantes de acuerdo con la normativa vigente en el país para productos veterinarios.

DESTINADO A:

Bovinos **Equinos** **Ovinos**

Caprinos **Caninos**

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
100 ml y 200 ml

SEDACOL

¡TU MEJOR OPCIÓN PARA EL CÓLICO GASEOSO!

SOLUCIÓN INYECTABLE PARA TRATAR SÍNDROMES CONGESTIVOS DEL APARATO GASTROINTESTINAL

- Previene y favorece la recuperación del desplazamiento del abomaso.
- Rápida acción en la parada rumial.
- Preventivo y curativo de la cetosis.
- Auxilia en las intoxicaciones en general.
- Exclusiva formulación.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Sorbitol	50 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

DOSIS
Bovinos: Becerros y novillas 20 a 50 ml. Animales adultos: 100 a 200 ml.
Equinos: Potros: 20 a 50 ml.
Yeguas y Padrillos: 100 a 200 ml.
Ovinos y Caprinos: Animales jóvenes: 10 a 20 ml. Animales adultos 20 a 50 ml.
Caninos: Cachorros y adultos: 2 a 10 ml.

Aplicar 2 horas después la mitad de la dosis inicial, repetir la dosis de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

PROPIEDADES
De gran importancia en el tratamiento de los síndromes congestivos del tracto gastrointestinal, que se traducen en cólicos gaseosos, meteorismos de rumiantes, timpanismo y acetonemias.

El D-Sorbitol restaura rápidamente el equilibrio ácido-base, además ejerce un gran efecto laxante, promueve la diuresis favoreciendo la protección contra el edema cerebral y disminuyendo considerablemente la presión intraocular durante el estado congestivo.

Se presenta en forma concentrada y cuando es aplicado directamente en el torrente sanguíneo, se esparce rápidamente con gran facilidad, restaurando el bienestar del animal.

También contribuye efectivamente en la prevención de lesiones e insuficiencia hepática, debido a las intoxicaciones por alimentos, medicamentos, paresis del parto, lactancia o tetania.

DESTINADO A:

Equinos

PRESENTACIÓN
CAJA CON
8 Jeringas de 12 g c/u

GASTROCAL

OMEPRAZOL 37%

PROTECTOR GÁSTRICO
REGULADOR / INHIBIDOR DE LA SECRECIÓN ÁCIDO GÁSTRICA
ANTIÁCIDO Y ANTIULCEROSO

COMPOSICIÓN
Cada 100 g contiene:

Omeprazol	37 g
Excipientes c.s.p.	100 g

INDICACIONES
Para el tratamiento y prevención de recurrencia de úlceras gastroduodenales, incluso las ocasionadas por *Helicabacter pylori* dado que optimiza el uso de los antibióticos específicos para su tratamiento.
Actúa como inhibidor específico de la bomba de hidrogeniones en la célula parietal gástrica, provocando una inhibición reversible de la secreción ácida del estómago.
También para el tratamiento profiláctico de gastritis, esofagitis e irritaciones o erosiones de la mucosa gastroduodenal inducidas por medicamentos ya que produce una inhibición reversible de la secreción ácida del estómago.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN - DOSIFICACIÓN
Vía oral. Suministrar con la jeringa dosificadora oral la cantidad indicada acorde al peso del animal y tipo de indicación (tratamiento o prevención).
Para su óptimo resultado se recomienda su administración cuando el animal está en ayunas y no suministrarle alimento hasta pasada media hora posdosificación.
Administrar solo a animales mayores de un mes de edad o con un peso superior a 90 kg.

DOSIS
Tratamiento: Un gramo de **GASTROCAL** cada 90 kg de peso animal (equivalente a 4 mg / kg) por día durante 28 días consecutivos y para prevenir la recurrencia de las patologías tratadas: un gramo de **GASTROCAL** cada180 kg de peso animal (equivalente a 2 mg / kg) por día durante 28 a 30 días más.

Preventivo: Un gramo de **GASTROCAL** cada 180 kg de peso animal (equivalente a 2 mg / kg p.v.) por día durante 28 días consecutivos.
En animales con pesos mayores a 550 kg se recomienda dosificarlos dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES DE USO | PRECAUCIONES:
- No administrar en otras especies.
- No administrar en equinos menores de 1 mes de edad o con menos de 90 kg de peso.
- No se conocen sus efectos en hembras preñadas o en lactación.
- Almacenar lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- No volver a utilizar los envases vacíos, eliminar envases y sobrantes según la normativa vigente del país para productos veterinarios.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
250 ml y 500 ml

ABAMECTINA

ANTIPARASITARIO INYECTABLE
ENDECTOCIDA PARA BOVINOS

- Empieza su acción 4 - 6 horas después de la aplicación.
- Evita Gusano Barrenador y nuche en las castraciones.
- Más eficaz que otros endectocidas.
- Mejor relación precio/calidad.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Abamectina	1,0 g
Vehículo c.s.p.	100,0 ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

DOSIS
Bovinos: 1 ml para cada 50 kg de peso vivo (200 mcg/kg de peso vivo).
Hasta 50 Kg 1 ml. De 51 a 100 - 2 ml.
De 101 a 150 - 3 ml. De 151 a 200 - 4 ml.
Y así sucesivamente.
Nota: para animales con peso superior a 600 kg obedecer dosis de 1 ml por cada 50 kg de peso vivo.

PROPIEDADES
Solución inyectable de Abamectina al 1%, de amplio espectro, acción prolongada, seguro y eficaz para tratar y controlar parásitos internos (Nematodos) y externos del ganado. No aplicar en animales con menos de 4 meses de edad o 150 kg de peso vivo. No utilizar en animales con una condición corporal deficiente.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 7 días. **Leche:** 48 horas.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
100 ml - 250 ml y 500 ml

FORTMISOL

ANTIPARASITARIO (VERMÍFUGO) INTERNO E
INMUNOESTIMULANTE INESPECÍFICO PARA EL GANADO BOVINO

- Eficaz contra *Haemonchus* en dosis doble.
- Mejor resultado en los Gusanos de Pulmón.
- Estimulante del sistema inmune.
- Sin descarte de leche.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Fosfato de Levamisol*	18,8 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

(*) Equivalentes a 12,7 g de Levamisol Base.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

DOSIS
Aplicar 1 ml por 40 kg de peso vivo, en casos de infestaciones altas por *Trichostrongylus axei* y *Ostertagia* spp. se recomienda duplicar la dosis; o sea, 2 ml por 40 kg de peso vivo.
Dosis superiores a 10 ml deben ser subdivididas y aplicadas en diferentes puntos de inyección.

PROPIEDADES
Controla todos los tipos de helmintos de importancia económica en el ganado: *Haemochus* spp, *Cooperia* spp, *Trichostrongylus* spp, *Oesophagostomum radiatum, Chabertia* spp y *Dictyocaulus viviparus* (Gusano del Pulmón).
Cuando es aplicado después de las vacunaciones de rutina tiene un efecto inmunoestimulante inespecífico.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 7 días. **Leche:** 48 horas.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
50 ml - 200 ml y 500 ml

IVERMIN

¡LA IVERMECTINA AL 1% QUE SÍ FUNCIONA!

VERMÍFUGO ENDECTOCIDA PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE LOS PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS

- Puede ser administrado en todas las edades de los animales.
- Asociación de avermectina B1a-B1b donde la fracción B1a es 98,78% lo que le confiere la alta calidad de la molécula.
- Vehículo de rápida absorción.
- Seguro y eficaz.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	1 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

DOSIS
1 ml para cada 50 kg de peso vivo (200 mcg/kg de peso vivo). Hasta 50 kg 1 ml. De 51 a 100 - 2 ml. De 101 a 150 - 3 ml De 151 a 200 - 4 ml. Y así sucesivamente. Nota: para animales con peso superior a 600 kg obedecer dosis de 1 ml por cada 50 kg de peso vivo.

PROPIEDADES
La Ivermectina es capaz de eliminar los parásitos internos y externos en el ganado con gran eficacia.
Se puede utilizar con seguridad en el ganado de todas las edades.
No causa aborto en cualquier etapa del embarazo y no interfiere con la fertilidad de los toros.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 35 días. **Leche:** 28 días.

DESTINADO A:

Bovinos **Ovinos**

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
100 ml y 250 ml

TAITEC

ENDO Y ECTOPARASITICIDA DE ACCIÓN SISTÉMICA Y EFECTO SOSTENIDO

- Totalmente eficaz contra *Fasciola hepatica* en su fase adulta y contra *Haemonchus* spp.
- Actúa contra el gusano nasal en ovejas.
- Fórmula exclusiva.
- Sin resistencia.
- Endectocida.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Closantel	25 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

DOSIS
Endoparásitos: 5 mg/kg de peso vivo equivalente a 1 ml para cada 50 kg de peso vivo.
Ectoparásitos: 10 mg/kg de peso vivo equivalente a 2 ml para cada 50 kg de peso vivo.
Hasta 50 kg 1 ml. De 51 a 100 - 2 ml. De 101 a 150 - 3 ml. De 151 a 200 - 4 ml. Y así sucesivamente.

PROPIEDADES
El Closantel se puede considerar de amplio espectro y también puede ser utilizado para el tratamiento de hemoncosis, bunostomosis y "Gusanos Nasal" en ovejas *(Oestrus ovis)*. El Fármaco es bien absorbido y distribuido por el metabolismo hepático y excretado por vía renal.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 28 días. **Leche:** 28 días.

DESTINADO A:

Bovinos

Ovinos

Porcinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN OLEOSA INYECTABLE
50 ml - 250 ml y 500 ml

CALBOMAX

¡DORAMECTINA 1%!

- Endectocida - Antiparasitario de amplio espectro contra endo y ectoparásitos.

COMPOSICIÓN **Cada 100 ml contiene:**

Doramectina	1 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES

Bovinos: Para el control de Nematodos gastrointestinales (adultos y L4) de: *Haemonchus* spp., *H. contortus, H. placei, y H. similis; Ostertagia ostertagi* (Larvas Inhibidas), *O. lyrata; Trichostrongylus* spp., *T axei y, T columbriformis; Cooperia* spp., *C. oncophora* (incluyendo Larvas Inhibidas), *C. punctata, C. pectinata, C. spatulata y C. sumabada; Oesophagostomum radiatum; Bunostomum phlebotomum; Strongyloides papillosus; Nematodirus helvetianus* y *N. spathiger; Trichuris* spp., *T vulpis* y *T ovis* (adulto).
Nematodos pulmonares (adultos y L4) de: *Dictyocaulus viviparus* y *D. filaria.*
Parásitos del ojo: *Thelazia* spp.
Ectoparásitos: Garrapata: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus.*
Ácaros: *Psoroptes ovis; Sarcoptes scabiei.*
Piojos: *Linognathus vituli; Haematopinus eurysternus; Solenopotes capillatus.*
Ura, Berne o Tórsalo: *Dermatobia hominis; Hypoderma bovis; Hypoderma lineatum.*
Bicheiras: *Cochliomyia hominivorax.*
También está indicado como auxiliar en el control de piojos masticadores *(Damalinia bovis).*

Ovinos: Gastrointestinales (adultos y L4): *Haemonchus contortus; Ostertagia cicumcincta* (incluso Larvas Inhibidas); *Trichostrongylus* spp., *T. axei, T. colubriformis, T. vitrinus; Chabertia* spp.; *Cooperia* spp., *C. oncophora, C. curticei* (solo L4); *Oesophagostomum venulosum* (solo adultos); *Nematodirus* spp.; *Trichuris* spp.
Pulmonares: *Dictyocaulus filaria.*
Ectoparásitos: Ácaros: Miiasis *(Cochliomyia hominivorax);* gusano nasal *(Oestrus ovis).*

Porcinos: Gastrointestinales (adultos y L4): *Ascaris suum; Hyostrongylus rubidus; Oesophagostomum* spp., *O. dentatum, O. quadrispinulatum; Trichuris suis; Strongyloides ramsoni* (adultos).
Pulmonares: *Metastrongylus* spp.
Parásitos Renales: *Stephanurus dentatus.*
Ectoparásitos: Ácaros: *Sarcoptes scabiei.*
Piojos: *Haematopinus suis.*
No emplear en casos de alergia o en animales con antecedentes de hipersensibilidad a la droga.

El tratamiento debe ser aplicado bajo prescripción Profesional.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO

Agitar bien el producto antes de usar. **Parenteral:** por inyección subcutánea preferentemente en zonas de piel laxa o intramuscular en la región de la nuca en bovinos y ovinos; e intramuscular exclusivamente en porcinos.

DOSIS Recomendada: **Bovinos y Ovinos:** 1 ml cada 50 kg de peso (equivalentes a: 200 ug/kg de p.v. de Doramectina) por vía subcutánea preferentemente, en zonas de piel laxa o intramuscular en la región de la nuca.
Porcinos: 1 ml cada 33 kg de peso (equivalentes a: 300 ug/kg de p.v. de Doramectina) por vía intramuscular exclusivamente.

TIEMPO DE RETIRO

Carne:
- Bovinos y Ovinos: 49 días.
- Porcinos: 23 días.

No administrar en hembras en producción láctea, cuya leche se destine para consumo humano o industrialización.

DESTINADO A:

Bovinos

Ovinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN OLEOSA INYECTABLE
100 ml y 500 ml

MOXICAL

¡MOXIDECTINA 1%!

- Antiparasitario contra parásitos gastrointestinales, pulmonares y externos.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Moxidectina	1,0 g
Excipientes c.s.p.	100,0 ml

INDICACIONES
Es un antiparasitario inyectable que controla y trata los parásitos internos y externos de bovinos y ovinos.

Espectro de acción: Adultos y Larvas de *Haemonchus* spp., (*), *Cooperia* spp., *Ostertagia* spp. (*), *Trichostrongylus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Chabertia ovina, Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Trichuris ovis.*
(*) Inclusive larvas inhibidas de *Haemonchus* spp., y *Ostertagia* spp.

Pulmonares: Adultos y larvas de *Dictyocaulus* spp.

Parásitos externos: Garrapata común del ganado bovino *Rhipicephalus (Boophilus) microplus,* ácaros de la sarna y piojos chupadores.

En caso de infestaciones por piojos masticadores en bovinos *(Bovicola bovis),* ayuda en el control del mismo.

El tratamiento debe ser aplicado bajo prescripción profesional.

DOSIS - VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Agitar bien el producto antes de usar.
Se dosifica a razón de 1 ml por cada 50 kg de peso corporal, vía inyectable subcutánea, tomando las medidas de asepsia correspondientes a la aplicación de inyectables.
Protege por un período de 28 días en caso de parásitos gastrointestinales y pulmonares.
En infestación por *Dictyocaulus viviparus,* 42 días.

En casos de sarna ovina se recomienda repetir la dosis a los 7 días.

Rhipicephalus microplus (garrapata común del ganado), en predios en erradicación el producto deberá ser utilizado cada 21 días.
Psoroptes communis var ovis (ácaros de la sarna ovina), administrar 1 ml cada 45 kg de peso, dos dosis con un intervalo de 7 días entre ambas.

Puede utilizarse en hembras preñadas y también en machos reproductores.

TIEMPO DE RETIRO
Carne: 35 días.
No utilizar en hembras lactantes cuya leche se destine a consumo humano o industrial.

DESTINADO A:

Bovinos

Ovinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
250 ml y 500 ml

RAFOCAL

¡RAFOXANIDA 15%!

- Antiparasitario y fasciolicida inyectable para bovinos y ovinos.

COMPOSICIÓN Cada 100 ml contiene:
Cada 100 ml contiene:

Rafoxanida	15%
Excipientes c.s.p.	100%

INDICACIONES
Control, prevención y tratamiento de Parasitosis Internas, Fasciolosis en Bovinos y Ovinos, considerada como una de las enfermedades parasitarias más importantes del mundo de los rumiantes domésticos.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Parenteral: Inyectable Subcutáneo.

DOSIS
Bovinos - Ovinos: 1 ml de **Rafocal** 50 cada 50 kilos de peso vivo, que corresponde a 3 mg de Rafoxanida por kilo de p.v por la vía subcutánea.
En caso de alta infestación se puede repetir el tratamiento a los 21 días contra fasciolosis y al mes contra parásitos gastrointestinales.

TIEMPO DE RETIRO
Carne:
- Bovinos: 28 días.
- Ovinos: 35 días.
Leche: No administrar a hembras en lactación cuya leche se destine al consumo humano.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE

250 ml y 500 ml

18% RICOFORT

¡RICOBENDAZOLE 18%!

- Antiparasitario Interno de amplio espectro y triple acción.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Ricobendazole	18,0 g
Excipientes c.s.p.	100,0 ml

INDICACIONES

Antiparasitario interno para bovinos de amplio espectro y triple acción (adultos, inmaduros y huevos) contra Nematodos Gastrointestinales y Pulmonares.
Trematodos (estadios adultos de *Fasciola hepatica*).

VÍA DE APLICACIÓN

Se administra por vía inyectable subcutánea.

DOSIS

1 ml cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 3,57 mg / kg de p.v. de Ricobendazole) para los siguientes géneros de parásitos: *Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Strongyloides, Oesophagostomum, Chabertia, Neigeria, Dictyocaulus* y *Tenias.*

En Ostertagiasis inhibida: *1 ml cada 24 kg de peso vivo
(equivalente a 7,5 mg / kg de p.v. de Ricobendazole).
*Volúmenes iguales o mayores a 10 ml dividir la dosis en más de un punto de inoculación.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 21 días.
No faenar animales cuya carne se destine a consumo humano hasta pasados 21 días de la última dosificación.

Leche: 72 horas.
No consumir la leche o enviarla a industria hasta pasadas 72 horas.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE

500 ml

IVERMIN GOLD 3,15%

FÓRMULA TIXOTRÓPICA

¡ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO INYECTABLE PARA BOVINOS!

- Garrapaticida.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	3,15 g
Excipientes c.s.p.	100,00 ml

INDICACIONES

Tratamiento, control y profilaxis de infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares, así como también para las ectoparasitosis por piojos, sarnas, bernes y garrapatas de los bovinos.

El producto posee un mecanismo de absorción lenta y de eficacia prolongada, que elimina los parásitos indicados y previene nuevas infestaciones por largos períodos (efecto profiláctico).

Espectro de actividad: Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus* spp.; *Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata; Trichostrongylus* spp.; *Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Cooperia pectinata; Oesophagostomum radiatum; Strongyloides papillousus; Nematodirus elvetianus, Nematodirus spathiger; Toxocara vitulorum; Trichuris* spp.; *Bunostomum phlebotomum.*

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus, Dictyocaulus laria.*

Actúa en la profilaxis de las larvas de 3er. estadio por un período de entre 5 y 7 semanas.

Ectoparásitos: Garrapatas: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus.*

Bernes: *Dermatobia hominis* (estadios parasitarios). Más de 125 días de eficacia con una reducción próxima al 90%.

Piojos succionadores: *Haematopinus* spp.; *Linognathus vituli; Solenopotes capillatus.*

Sarnas causadas por: *Psoroptes* spp.; *Sarcoptes* spp., (hasta 60 días de actividad) *Chorioptes* spp. Está indicado como ayuda en el control de la población de *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Agitar bien durante un minuto antes de dosificar, manteniendo cierta periodicidad de agitación en el transcurso de las dosificaciones.

Administrar 1 ml cada 50 kg de peso vivo por vía subcutánea.

La formulación contiene 3,15% de Ivermectina, lo que proporciona una dosis de 630 mcg de Ivermectina por kg de peso vivo.

Intervalo entre dosis: Entre 5 y 7 semanas contra nematodos gastrointestinales y pulmonares, 100 días contra bernes.

Una sola aplicación es suficiente para combatir infestaciones de sarna psoróptica; si fuera necesario repetir a los 20 días.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 110 días.

Leche: No administrar en animales cuya leche sea destinada al consumo humano.

DESTINADO A:

Bovinos **Equinos**

Ovinos **Caprinos**

Caninos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
100 ml y 200 ml

PIROSAN 7%

FÁRMACO PARA EL TRATAMIENTO CONTRA HEMOTRÓPICOS (BABESIA Y TRIPANOSOMA)

- Acción rápida, 30 minutos después de la aplicación.
- Muy seguro y se puede aplicar a vacas preñadas o en lactancia.
- Contiene Fenazona - acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria.
- Eficaz en el tratamiento de la tristeza parasitaria bovina y la babesiosis canina.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Diaceturato de Diminazeno	7,00 g
Fenazona	8,75 g
Vehículo c.s.p.	100,00 ml

INDICACIONES
Es efectivo en el tratamiento de las enfermedades causadas por hemotrópicos como la Piroplasmosis o Babesiosis y la Tripanosomosis.

Además posee excelente efecto antipirético, produce alivio sintomático inmediato y favorece la rápida recuperación animal.

Actúa rápidamente sobre los parásitos sensibles y normalmente luego de la aplicación se observa rápidamente el bienestar de los síntomas de la enfermedad, favoreciendo una recuperación rápida del animal.

Es indicado en el tratamiento de las infecciones causadas por Trypanosomas *(Trypanosoma vivax, Trypanosoma congolense, Trypanosoma equiperdum, Trypanosoma brucei, Trypanosoma evansi)* y por Babesias *(Babesia bovis, Babesia ovis, Babesia canis).* Posee acción analgésica y antipirética.

DOSIS TERAPÉUTICA
3,5 mg de Diaceturato de Diminazeno/kg peso corporal, en dosis única.

DOSIS DEL PRODUCTO
0,05 ml/kg de peso corporal.
En los casos de *Trypanosoma* spp., utilizar el doble de la dosis terapéutica (7,0 mg/kg).
De 20 kg = 1 ml.
De 40 kg = 2 ml.
De 100 kg = 5 ml.
De 300 kg = 15 ml.
De 600 kg = 30 ml.
Y así sucesivamente.

TIEMPO DE RETIRO
Carne: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos: 30 días.
Leche: Bovinos - Ovinos - Caprinos: 72 horas.

DESTINADO A:

Bovinos · Equinos · Ovinos

Caprinos · Porcinos · Caninos

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE

50 ml y 100 ml

CALBIZOL

IMIDOCARB
DIPROPIONATO 12%

¡TRATAMIENTO PARA ANAPLASMOSIS - PIROPLASMOSIS!

- Indicado en el tratamiento, control y prevención de la Anaplasmosis y Piroplasmosis / Babesiosis.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Imidocarb Dipropionato	12 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Hemoparasiticida, para el tratamiento, control y prevención de enfermedades causadas por hemotrópicos, asociadas a Protozoarios y Rickettsias susceptibles al Dipropionato de Imidocarb; como puede ser fiebre, ictericia, anemia, Anaplasmosis y Piroplasmosis / Babesiosis.
No es una vacuna, el programa preventivo y el establecimiento de inmunidad contra Anaplasmosis y Piroplasmosis / Babesiosis, depende de la exposición de los animales a los agentes causales de las enfermedades.

El tratamiento debe ser aplicado bajo prescripción profesional.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Parenteral: por vía subcutánea o intramuscular acorde a indicaciones para cada especie.

DOSIS
Bovinos: Babesiosis (Piroplasmosis): 1 ml/100 kg de peso vivo, repitiendo la dosificación con un intervalo de 14 días entre ambas.
Anaplasmosis: 2,5 ml /100 kg., SC o IM, repitiendo con un intervalo de 14 días entre ambas.
Equinos: Babesiosis causada por *B. caballi:* 1 ml /24 kg de peso vivo vía IM (equivalentes a 3,4 mg/kg de peso vivo), repetir la dosis a las 72 horas después, y a las 2 semanas.
B. equi: 1 ml /20 kg de peso vivo vía IM (equivalentes a 4 mg/kg de peso vivo) repetir la dosis a las 72 horas después y a las 2 semanas repetir.
Ovinos y Caprinos: Babesiosis: 1 ml / 70 kg de peso SC.; repitiendo la dosificación 14 días entre ambas dosificaciones.
Caninos: Babesiosis: 1 ml cada 12 kg de peso IM o SC.
Ehrlichiosis y Hepatozoonosis: 1 ml cada 16 kg de peso IM o SC., en dos inyecciones separadas por 14 días.
Se recomienda en ésta especie la vía SC y diluir la cantidad de el producto a administrar en suero salino.
Porcinos: 1 ml cada 16 kg. de peso SC, repitiendo la dosificación con un intervalo de 14 días entre ambas.
Se recomienda realizar un tratamiento de soporte sintomatológico.

TIEMPO DE RETIRO
Carne: No faenar animales para consumo humano hasta 28 días después de la última aplicación.
Leche: No administrar a animales en lactación cuyo destino sea para el consumo humano.

DESTINADO A:

Bovinos **Equinos** **Ovinos**

PRESENTACIÓN
FRASCO SPRAY
500 ml / 230 g

MATA BICHEIRA CALBOS

INSECTICIDA - LARVICIDA Y FUNGICIDA

- Asociación efectiva de organofosforados.
- Acción curativa.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

D.D.V.P. (2,2-Diclorovinil-Dimetil Fosfato)	1,00 g
Clorfenvinfos (2-Cloro / 1(2,4-Diclorofenil)	
Vinil Dietil Fosfato	0,30 g
Esencia Citriodora	0,50 g
Violeta de Genciana	0,50 g
Glicol de Hexileno	13,30 ml
Xilol c.s.p.	100,00 ml

Propelente: Butano / Propano.

INDICACIONES
El producto está indicado en la profilaxis y tratamiento de bichos (Miiasis), causadas por larvas de mosca *Cochliomyia hominivorax* en bovinos, ovinos, equinos, y otras especies susceptibles.

Se debe aplicar en heridas accidentales y por otras causas, tales como: castración, descorne, trasquilada, marcación, amputación, caudectomía (corte de la cola) y postoperatorio en general.

Puede ser usado en rajaduras de cascos y en el ombligo de terneros recién nacidos.

HIPOFEN

ANTIPARASITARIO -VERMÍFUGO- ORAL

- Puede ser usado en potros y yeguas preñadas.
- No se necesita ayuno.
- Altamente seguro.
- Trata 500 kg de peso vivo.

DESTINADO A:

Equinos **Asnos**

PRESENTACIÓN
JERINGA CON
20 g

COMPOSICIÓN
Cada JERINGA contiene:

Febendazol	3,76 g
Excipiente c.s.p.	20 g

DOSIS ÚNICA
7,5 mg de Febendazol por kilo de peso vivo o 4 g de Hipofen para cada 100 kilos de peso vivo.

PROPIEDADES
Parasiticida para los equinos y asnos, que contiene en su formulación Febendazol. El fármaco pertenece al grupo de los Benzimidazoles y se caracteriza por un amplio espectro y margen de seguridad.
No tiene contraindicaciones para yeguas gestantes.

ENDOSTAC

ANTIPARASITARIO -VERMÍFUGO- COMPLETO

- Formulación exclusiva de amplio espectro.
- Acción ovicida, larvicida y adulticida.
- Eficiente contra la *Fasciola hepatica.*
- Mejor precio-calidad del mercado
- Trata 2.000 kg de peso vivo.

DESTINADO A:

Equinos

PRESENTACIÓN
JERINGA CON
25 g

COMPOSICIÓN
Cada 100 g contiene:

Albendazol Técnico 99%	40,4 g
Vehículo c.s.p.	100 g

DOSIS
La administración de 1,25 g de producto es suficiente para tratar 100 kg de peso vivo, equivalente a 5 mg de Albendazol por kg de peso vivo.

PROPIEDADES
Antihelmíntico de amplio espectro con actividad contra formas adultas de Trematodos *(Fasciola hepatica),* Cestodos *(Taenia* spp.) y contra las formas larvarias y adultas de Nematodos gastrointestinales y pulmonares.

DESTINADO A:

Equinos

PRESENTACIÓN
JERINGA CON
6 g

IVERMIN PASTA ORAL

VERMÍFUGO DE AMPLIO ESPECTRO

- Formulado para 600 kg de peso vivo.
- Puede ser administrado en yeguas preñadas.
- Eficaz para grandes y pequeños estróngilos y habronemosis.
- Indicado para el tratamiento y control de los principales parásitos internos de los equinos.

COMPOSICIÓN
Cada 100 g contiene:

Ivermectina	2,00 g
Vehículo c.s.p.	100,0 g

INDICACIONES
Es indicado para el tratamiento y control de los principales parásitos internos de los equinos, como:

Nematodos gastrointestinales: *Habronema muscae, Trichostrongylus axei* y *Oxyuris equi.*

Grandes estrongilos: *Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylusequinus.*

Pequeños estrongilos: *Cyathostomum labiatum, Cylicocyclus insigne, Cylicostephanus latinatum, Cyathostomum coranatum, Cyathostomum parteratum, Cyclicocyclus radiatus, Cylicocyclus elongatus, Cyathostomum tetracantum, Cyathostomum labratum, Cylicodontophorus bicoronatus, Posteriostomum ratzii* y *Gyalocephalus capitatus.*

DOSIS
La administración de 1 g del producto es suficiente para tratar 100 kg de peso, correspondiendo a 200 mg de Ivermectina por kg de peso vivo.
El émbolo del embalaje de **Ivermin Pasta Oral** presenta marcaciones graduadas a cada 50 kg de peso vivo.
Cada jeringa contiene cantidad suficiente de producto para tratar un animal de hasta 600 kg.

DESTINADO A:

Equinos

PRESENTACIÓN
JERINGA CON
12,2 g

EQUIMOX Gold

Moxidectina 2 g
Praziquantel 12,5 g

TENICIDA

¡ANTIPARASITARIO PARA EQUINOS SABORIZADO!

COMPOSICIÓN
Cada 100 g contiene:

Moxidectina	2,0 g
Praziquantel	12,5 g
Excipientes c.s.p.	

INDICACIONES
Antiparasitario de amplio espectro, seguro y eficaz para equinos, con acción sobre las formas maduras e inmaduras de los parásitos.

Elimina grandes y pequeños estróngilos, ascáridos, oxiuros, parásitos de los pulmones, gusanos del cuajo o gastrófilos (parásitos del estómago de los caballos que en su ciclo adulto se conocen como moscas de los reznos) y tenias.

Eficaz sobre estados de ciatostomas (pequeños estrongilidos) enquistados o inhibidos y cuando existe resistencia de los parásitos a los benzimidazoles.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Vía oral con la ayuda de la jeringa dosificadora.
Suficiente para 600 kg de peso vivo.
Se recomienda ser preciso en el cálculo del peso del equino a dosificar.

Dosis. Deslice el aro marcador hasta el peso del equino, quite la tapa e introduzca el pico de la jeringa en la boca para poder administrar el producto en la parte posterior de la cavidad bucal.

La jeringa dosificadora está graduada cada 100 kg de peso del animal, el cual recibirá la cantidad de producto correspondiente a la dosis recomendada: 0,4 mg de Moxidectina y 2,5 mg de Praziquantel por kg de peso.

Baja el contaje de huevos de parásitos en las heces por un período de más de 12 semanas.

Puede ser administrado a yeguas preñadas, reproductores y equinos en entrenamiento.

DESTINADO A:

Bovinos **Ovinos** **Caprinos**

PRESENTACIÓN
SUSPENSIÓN
200 ml y 1 Litro

CALBENDAZOLE 10%

ANTIPARASITARIO Y ANTIHELMÍNTICO COMPLETO DE ACCIÓN TANTO EN LAS FORMAS ADULTAS COMO EN LAS LARVAS Y HUEVOS

- Facilidad de aplicación en los animales confinados (sin generar estrés).
- Efectivo contra las formas larvarias.
- Eficaz contra la *Fasciola hepatica.*
- Amplio margen de seguridad.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Albendazol	10,0 g
Vehículo c.s.p.	100,0 ml

PROPIEDADES
Antihelmíntico oral para el tratamiento de nematodos gastrointestinales y pulmonares producidas por Nematodos sensibles al Albendazol, tanto para las formas adultas como para larvas y huevos. Antiparasitario interno del grupo de los Benzimidazoles.
Produce su efecto sobre los helmintos influyendo sobre la captación de los nutrientes. Actúa sobre el metabolismo energético inhibiendo la enzima fumarato reductasa, lo que conduce a la reducción del glucógeno que provoca la muerte por inanición del parásito. En algunos parásitos se ha visto que inhibe la síntesis de la proteína tubular.

DOSIS
Bovinos: Contra Nematodos Gastrointestinales, Cestodos y Verme Pulmonar: 1 ml/20 kg de peso vivo (5 mg/kg de Albendazol).
Contra Larvas Inhibidas de *Ostertagia* spp.: 0,75 ml/20 kg de peso vivo (7,5 mg/kg de Albendazol).
Contra la *Fasciola hepatica* (Cucaracha del Hígado): 1ml para cada 10 kg de peso vivo (10 mg/kg de Albendazol).
Ovinos: Contra Nematodos Gastrointestinales, Cestodos y Verme Pulmonar: 1 ml/20 kg de peso vivo (5 mg/kg de Albendazol).
Contra la *Fasciola hepatica* (Cucaracha del Hígado): 0,75 ml para cada 20 kg de peso vivo (7,5 mg/kg de Albendazol).

Nota: Administrar en dosis única.

TIEMPO DE RETIRO Carne: Bovinos: 14 días. Ovinos: 10 días. **Leche:** 72 horas.

DESTINADO A:

Bovinos **Ovinos**

PRESENTACIÓN
FRASCO CON
200 ml y 1 Litro

TAITEC ORAL

ANTIPARASITARIO INTERNO DE ACCIÓN SISTÉMICA Y EFECTO SOSTENIDO

- Totalmente eficaz contra *Haemonchus* spp. y contra *Fasciola* sp.
- Sin resistencia. • Endectocida.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Closantel	10 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES Parasiticida de acción prolongada debido a su unión con las proteínas plasmáticas y a su liberación sostenida. Es absorbido y distribuido de manera sistémica por todo el cuerpo, con un amplio margen de seguridad. No tiene sabor pronunciado y no es rechazado por los animales.

DOSIS Administración por vía oral, con el auxilio de la pistola dosificadora.
ENDOPARASITOSIS: Verminosis Gastrointestinales (Vermes) y Fasciolosis: 1 ml para cada 10 kg de peso vivo.
ECTOPARASITOSIS: Dematobiosis (Bernes) y Miasis (Bichera): 3 ml para 10 kg de peso vivo.
Oestrosis Ovina (Gusano Nasal): 1 ml para cada 10 kg de peso vivo, en única dosis.

TIEMPO DE RETIRO 15 días antes del sacrificio.

DESTINADO A:

Bovinos **Ovinos** **Caprinos**

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN ORAL

1 Litro - 3 Litros y 5 Litros

CLOZACAL

ENDOPARASITICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

- Indicado en el tratamiento y control de Parásitos Internos.
- Control de Endoparásitos *(Cotylophoron* sp. y *Fasciola* sp.).

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Levamisol Clorhidrato	3,00 g
Oxiclozanida	6,00 g

PROPIEDADES

CLOZACAL es una combinación antiparasitaria de amplio espectro diseñada para atacar simultáneamente Parásitos Gastrointestinales, Pulmonares, Tenias y Trematodos *(Cotylophoron* sp.).

INDICACIONES DE USO

Tratamiento y control de parasitos internos.

Gastrointestinales: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Chabertia* spp. *y Bunostomum* spp.

Pulmonares: *Dictyocaulus* sp. *Incluyendo forma larvaria inhibida de Dictyocaulus viviparus.*

Tenia: *Moniezia expansa, Moniezia benedeni.*

Trematodos: *Fasciola* sp, *Cotylophoron* sp.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía oral.

Se recomienda administrar una sola dosis. DOSIS ÚNICA.

DOSIS

Bovinos: 2,5 ml de **CLOZACAL** por cada 10 kg de peso.

Ovinos y Caprinos: 0,5 ml por cada 2 kg de peso vivo.

Se recomienda administrar una sola dosis | DOSIS ÚNICA.

PRECAUCIONES

No aplicar organofosforado a los animales tratados dentro de los 14 días antes y después del tratamiento con **CLOZACAL.**

Agítese antes de usar.

Conservar en lugar seco y fresco, lejos de la luz solar, a temperatura menor a 30 °C.

Descartar envases y sobrantes de acuerdo a la normativa vigente en el país para productos veterinarios.

DESTINADO A:

Equinos · Bovinos · Ovinos · Caprinos · Porcinos · Caninos · Felinos

PRESENTACIÓN
FRASCO AMPOLLA CON
10 ml - 50 ml - 100 ml y 200 ml

PLACENCAL

HORMONA A BASE DE OXITOCINA SINTÉTICA INYECTABLE

- Tratamiento de retención de la placenta.
- Favorece el inicio de la lactancia.
- Adyuvante en los partos difíciles.

COMPOSICIÓN Cada 100 ml contiene:

Oxitocina Sintética	2 mg
Vehículo c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES
La hormona Oxitocina es responsable de la eyección de la leche: es sintetizada en el hipotálamo, cuerpo lúteo y almacenada en la neurohipófisis.
Su acción se produce en las fibras musculares lisas, estimulando su contracción.
En los mamíferos, la secreción de Oxitocina sigue a la estimulación de la glándula mamaria durante la lactancia o el ordeño.
Es responsable de la contracción del músculo liso uterino.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN IM.

DOSIS
Agujas y jeringas, antes del uso, deben ser sometidas a procesos normales de esterilización. Realizar antisepsia en el lugar de aplicación en el animal con algodón embebido en alcohol. Después de abierto, el producto deberá ser utilizado por 21 (veintiuno) días, conservado a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar directa. **Bovinos:** Vacas: 2 a 5 ml. **Equinos:** 2 ml a 6 ml. **Ovinos y Caprinos:** 0,5 ml a 1,5 ml. **Porcinos:** 1 ml a 3 ml. **Caninos y Felinos:** 0,5 ml a 1,5 ml.
La dosis puede variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 0 (cero) días.
Leche: 0 (cero) días.

DESTINADO A:

Bovinos · Yeguas · Cerdas

PRESENTACIÓN
FRASCO AMPOLLA DE **20 ml**
CAJA CON **2 Ampollas de 2 ml c/u**

SINCRONIZE

SINCRONIZADOR DEL CELO A BASE DE CLOPROSTENOL SÓDICO

- Adyuvante para el tratamiento de la placenta retenida.
- Inducción y sincronización del celo.
- Inducción de partos en cerdas.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Cloprostenol (equivalente a 25 mg de Cloprostenol)	26,30 mg
Vehículo c.s.p.	100 ml

DOSIS
Bovinos: 2 ml de producto (500 mcg de Cloprostenol) por vía intramuscular.
Yeguas y Cerdas: 1 ml por la vía IM.

PROPIEDADES
El Croprostenol es un análogo sintético de PGF2a de baja toxicidad y rápida eliminación por el cuerpo.
Su acción da origen a la regresión morfológica del cuerpo lúteo (Luteolisis) y consecuentemente una disminución en las concentraciones periféricas de progesterona, seguido de un aumento en la secreción de Gonadotropinas y el retorno al celo y ovulación normal.

DESTINADO A:

Bovinos **Equinos**

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
50 ml y 100 ml

CALDIOL
HORMONAL

¡INDICADO EN LA INDUCCIÓN Y SINCRONIZACIÓN DEL CELO!

- En los programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo, como complemento del uso de dispositivos intravaginales.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Benzoato de Estradiol	0,10 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Hormonal, indicado en la inducción y sincronización del celo, anestro posparto, celos silenciosos, como parte de los protocolos de Inseminación Artificial en combinación con progestágenos y prostaglandinas o cuando es requerido un efecto estrogénico terapéutico (metritis, retención de placenta, piómetra, etc.).

En los programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo, como complemento del uso de dispositivos intravaginales, tanto al momento de su aplicación o al retiro de los mismos.

El tratamiento debe ser aplicado bajo prescripción profesional.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Parenteral: Por vía IM, aplicando las medidas de asepsia y antisepsia necesarias para la administración de inyectables.
Cada ml contiene 1 mg de Benzoato de Estradiol.

DOSIS
Bovinos: Anestro posparto 1 ml luego de la administración del progestágeno.
Sincronización de celos 2 ml/animal antes del uso del progestágeno y 1 ml luego del uso del progestágeno.

Retención de placenta 5 a 10 ml/animal.

Celo silencioso 2 ml antes del uso del progestágeno.

Equinos: Para la introducción al estro y corrección del anestro, administrar por la vía intramuscular de 3,0 a 5,0 ml.

TIEMPO DE RETIRO
No requiere.

DESTINADO A:

Bovinos (Vacas y Novillas)

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
50 ml y 100 ml

CIPIOCAL

¡HORMONAL!

- El Cipionato de Estradiol es de más larga vida (más tiempo actuando en el animal).

COMPOSICIÓN

Cipionato de Estradiol	0,05 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
El **Cipiocal** es un producto hormonal, de acción prolongada cuyo principio activo es un derivado semisintético del 17 Beta Estradiol (Cipionato de Estradiol).

Está indicado para uso en los programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo como complemento en los casos de tratamiento con estrógenos para la inducción y sincronización de celos con progestágenos, con prostaglandinas y GnRH o como complemento en el tratamiento del anestro posterior al parto, o en caso de sincronización de celo con prostaglandinas y GnRH.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Parenteral: Por vía IM, aplicando las medidas de asepsia y antisepsia necesarias para la administración de inyectables.
Cada ml contiene 1 mg de Cipionato de Estradiol.

DOSIS
Dosis Recomendada: 1 ml de **Cipiocal** / por animal
(cada ml del producto contiene 0,5 mg de Cipionato de Estradiol).
En programas de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) aplicar 1 ml de **Cipiocal** el día de la retirada de los dispositivos intravaginales **(Intragest).**

TIEMPO DE RETIRO
No requiere.

DESTINADO A:

Bovinos (Vacas) **Equinos (Yeguas)**

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
50 ml

REPROGEST

Buserelina Acetato 0,00042%

¡HORMONA SINTÉTICA ANÁLOGA A GnRH!

- Producto hormonal sintético a base de Acetato de Buserelina.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:
Buserelina Acetato 0,00042 g.
(Buserelina base equivale a 0,0004 g).

INDICACIONES
REPROGEST es un producto hormonal sintético a base de Acetato de Buserelina, para el tratamiento del anestro por causas ováricas, quistes foliculares, para uso en programas de Inseminación Articial (IA), Sincronización del Celo a Tiempo Fijo, etc.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía de administración parenteral, preferiblemente intramuscular aunque también puede usarse la vía subcutánea y la intravenosa, aplicando las medidas de asepsia correspondientes a la administración de inyectables.

DOSIS
Vacas: En infertilidad por presencia de quiste folicular 5 ml por animal, para mejorar el índice de preñez, en protocolos hormonales y para sincronización de estro y ovulación 2,5 ml por animal.

Yeguas: Para inducir ovulación 10 ml por animal y para mejorar el índice de concepción después de la administración durante la fase luteal seguido del apareamiento o IA usar 10 ml por animal.

TIEMPO DE RETIRO
Carne: 0 (cero) días.
Leche: 0 (cero) horas.

DESTINADO A:

Bovinos (Vacas y Novillas)

PRESENTACIÓN
10 DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES
de 43 g c/u

INTRAGEST 0.6

¡DISPOSITIVO INTRAVAGINAL IMPREGNADO CON PROGESTERONA 0,60 g!

- Sistema de Liberación Hormonal para la Sincronización del Celo.

COMPOSICIÓN
Cada dispositivo intravaginal de 43 g, contiene:
Progesterona Micronizada (principio activo) 0,60 g.

INDICACIONES
Para la inducción y sincronización del ciclo estral en bovinos: En protocolos de Inseminación Articial a Tiempo Fijo (IATF), en trasplante de embriones, para la inducción y sincronización del celo en vacas cíclicas y no cíclicas, para obtener mejoras de la tasa de preñez en vacas de cría y servicio natural.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Se aplica de forma intravaginal 1 dispositivo por animal, que será retirado a los 7-8 días según el Médico Veterinario actuante.

TIEMPO DE RETIRO
No requiere.

DESTINADO A:

Bovinos (Vacas y Novillas)

PRESENTACIÓN
10 DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES
de 43 g c/u

INTRAGEST 1.38

¡DISPOSITIVO INTRAVAGINAL IMPREGNADO CON PROGESTERONA 1,38 g!

- Sistema de Liberación Hormonal para la Sincronización del Celo.

COMPOSICIÓN
Cada dispositivo intravaginal de 43 g, contiene:
Progesterona Micronizada (principio activo) 1,38 g.

INDICACIONES
Para la inducción y sincronización del ciclo estral en bovinos: En protocolos de Inseminación Articial a Tiempo Fijo (IATF), en trasplante de embriones, para la inducción y sincronización del celo en vacas cíclicas y no cíclicas, para obtener mejoras de la tasa de preñez en vacas de cría y servicio natural.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Se aplica de forma intravaginal 1 dispositivo por animal, que será retirado a los 7-8 días según el Médico Veterinario actuante.

TIEMPO DE RETIRO
No requiere.

DESTINADO A:

Bovinos **Ovinos** **Caprinos**

Porcinos **Caninos**

PRESENTACIÓN
FRASCO **de 5.000 UI eCG**
DILUYENTE **de 25 ml**

REPROCAL PMSG 5000

¡HORMONA DE GONADOTROPINA CORIÓNICA EQUINA!

- Contiene la hormona PMSG que es una glicoproteína de elevado peso molecular obtenida del suero de yegua preñada.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

eCG (Liofilizado)	5.000 UI.
Excipientes	0,052 g.

INDICACIONES
REPROCAL 5000 estimula el desarrollo del folículo ovárico en la hembra y la actividad espermatogénica en el macho.
Induce la superovulación en hembras donantes de embriones. Induce estros fértiles en hembras en anestro, principalmente durante el anestro estacional (ovejas/cabras), en anestro posparto y en animales prepúberes.
Aumenta el grado de sincronización del estro y ovulación cuando es usado asociado a progestágenos intravaginales preferiblemente en inseminación artificial en ovinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía de administración subcutánea o intramuscular.

DOSIS
Adicionar 5 ml del diluyente estéril en el vial conteniendo el polvo liofilizado.
Homogenizar. Transferir la solución al vial del diluyente.
La solución obtenida es de 200 UI/ml.

Bovinos:
- **Inducción Estro:** 400-600 (UI/dosis). Al momento de retirar los dispositivos con progestágenos.
- **Superovulación:** 2500-3000 (UI/dosis). 36 a 48 horas antes de cesar el tratamiento con progestágeno o prostaglandinas.

Ovinos:
- **Inducción Estro:** 300-500 (UI/dosis). Al momento de retirar los dispositivos con progestágenos.
- **Superovulación:** 800-1000 (UI/dosis). 36 a 48 horas antes de cesar el tratamiento con progestágeno o prostaglandinas.

Caprinos:
- **Inducción Estro:** 300-600 (UI/dosis).
- **Superovulación:** 800-1000 (UI/dosis).

Porcinos:
- **Inducción Estro:** 700-1000 (UI/dosis).
- **Superovulación:** 1000-1500 (UI/dosis).

Caninos:
- **Superovulación:** 100-200 (UI/dosis).

TIEMPO DE RETIRO Carne: 0 (cero) días. **Leche:** 0 (cero) horas.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
FRASCO CON **1 Litro**

CIPERMETRINA 6% POUR-ON

¡LA ELECCIÓN CORRECTA!
PARA LA ELIMINACIÓN DE GARRAPATAS Y MOSCAS

- Coloración roja para una mejor visualización del animal tratado.
- Control de Garrapatas, Mosca de Cuernos y Establos.
- Con la mayor concentración del mercado.
- Facilidad de aplicación.
- Con descarte de leche hasta las 24 horas.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina	6,0 g
Vehículo c.s.p.	100,0 ml

DOSIS
Aplicar 10 ml del producto para cada 100 kg de peso corporal, en dosis única.
Para animales con más de 500 kg, aplicar dosis máxima recomendada de 60 ml/animal.

PROPIEDADES
Es un parasiticida del grupo de los piretroides, de uso externo, en forma de "Pour-On", para el control de garrapatas, piojos y moscas del ganado.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 10 días. **Leche:** 24 horas.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
FRASCO CON **1 Litro**

DOUBLE KILL

ABAMECTINA + FLUAZURON **POUR-ON**

¡PRODUCTO FORMULADO PARA EL CONTROL ESTRATÉGICO DE GARRAPATAS, GUSANOS, MOSCAS DE LOS CUERNOS, LARVA DE *DERMATOBIA HOMINIS* (TÓRSALO, NUCHE O REZNOS) Y NEMATODOS GASTROINTESTINALES!

- Doble Muerte Fluazurón + Abamectina.
- Actúa contra garrapatas y gusanos.
- Ayuda al control de larvas de *Dermatobia hominis* (Tórsalo, Nuche o Reznos) y mosca de los cuernos.
- Combate los principales endoparásitos (Nematodos gastrointestinales).
- Sencilla y fácil aplicación.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Fluazurón	3.0 g
Abamectina	0.5 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
DOUBLEKILL CALBOS está indicado para el control estratégico de garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y mosca de los cuernos *(Haematobia irritans)* y para el control de Ura *(Dermatobia hominis):* Tórsalo, Nuche o Reznos.
También está indicado para el tratamiento de bovinos infestados por nematodos gastrointestinales *(Haemonchus placei, Cooperia punctata, Cooperia spatulata, Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus axei* y *Trichuris discolor).*

DOSIS
DOUBLEKILL CALBOS debe administrarse por vía tópica (pour-on), con aplicación en la línea dorsal del bovino (lomo), a una dosis de 1 ml por cada 10 kg de peso vivo. Producto para aplicación en dosis única.

TIEMPO DE RETIRO
Carne: 60 días.
Leche: No administrar en animales cuya leche sea destinada al consumo humano.

DESTINADO A:

Bovinos **Ovinos**

PRESENTACIÓN
FRASCO CON
200 ml - 500 ml y 1 Litro

AMITRAZ BAÑO POR ASPERSIÓN

ASPERSIÓN - GARRAPATICIDA • SARNICIDA • PIOJICIDA

- Antiparasitario de uso externo, por aspersión.
- Para el control de garrapatas.
- Tratamiento de sarna demodécticas y sarcópticas.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Amitraz (NN-di (2,4 Xilil-imino-metil Metilamina)	12,5 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Indicado para el control de las garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* en los Bovinos.
En Ovinos para sarnas y piojos, en el combate de ácaros de los géneros *Chorioptes, Sarcoptes, Psoroptes* y piojos de los géneros *Linognathus* y *Damalinia ovis.*

DOSIS
Bovinos: Diluir 1 litro en 500 litros de agua (40 ml/20 litros de agua), aplicar por aspersión un volumen mínimo de 5 litros de la mezcla/animal. Repetir la aplicación si es necesario después de 14 días.
Ovinos: Utilizar en baños de inmersión 4 litros para cada 1000 litros de agua.
Para recarga utilizar 4 litros para cada 500 litros de agua.
Repetir el baño si es necesario luego de 10 días.

TIEMPO DE RETIRO Carne: Bovinos - Ovinos: 14 días. **Leche:** 24 horas.

DESTINADO A:

Bovinos **Bufalinos**

PRESENTACIÓN
FRASCO CON
200 ml - 500 ml y 1 Litro

Gado Limpo

BAÑO POR ASPERSIÓN

ANTIPARASITARIO EXTERNO
GARRAPATICIDA • BERNICIDA • PIOJICIDA Y MOSQUICIDA

- Excelente opción para la resistencia a productos que contienen piretroides.
- Eficacia del 95% en la lucha contra las garrapatas.
- Efectivo en locales e instalaciones.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

DDVP (0,0 Dimetil 2,2 - Diclorovinil Fosfato)	60 g
Clorfenvinfos (2 Cloro I (2-4 Diclorofenil) Vinil Dietil Fosfato	20 g
Alquil Aril Sulfonato de Calcio	20 g
Xilol c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Actúa contra Garrapatas, Ura (boro), Moscas y Piojos.
Indicado en el combate de las garrapatas, larvas de moscas en general, principalmente las causantes de Ura *(Dermatobia hominis),* Miiasis (Bicheras) y adicionalmente: piojos, sarnas y moscas de instalaciones.

PROPIEDADES
Es una combinación de dos organofosforados.
Una excelente opción cuando los ectoparásitos han creado resistencia a productos que contienen Piretroides (Cipermetrina).

MODO DE USO
Uso externo. Diluido en agua y aplicado en baños de aspersión o pulverización.
Diluir en la proporción de 10 ml por cada 4 litros de agua.
Mezclar bien y rociar todo el cuerpo del animal, especialmente el interior de las orejas, base de los cuernos, inserción de la cola, papada, cara interior de las extremidades y ubre. En promedio, el consumo por animal es de 3 a 5 litros de la mezcla. Para bañar un animal adulto se deberían usar mínimo 4 litros.
El producto debe diluirse en el momento de su uso.
Después de la dilución, debe usarse dentro de las 24 horas.

Observaciones: Para un mejor funcionamiento, se recomienda realizar una predilución. Realizar los baños a primeras horas de la mañana o final de la tarde, que hay menos incidencia de sol.

DOSIS
Diluir una parte en 400 partes de agua, o sea:
- 12,5 ml - en 5 litros de agua.
- 25 ml - en 10 litros de agua.
- 50 ml - en 20 litros de agua.
- 100 ml - en 40 litros de agua.
- 250 ml - en 100 litros de agua.

Agitar hasta la completa homogeneización, utilizar como mínimo 3 litros de mezcla por animal.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 7 días. **Leche:** 48 horas.

DESTINADO A:

Bovinos **Ovinos**

PRESENTACIÓN
FRASCO CON
100 ml y 1 Litro

CIPERFON BAÑO POR ASPERSIÓN

¡PARA BAÑO POR ASPERSIÓN EN ANIMALES Y FUMIGACIÓN DE ÁREAS!

- Garrapaticida y bernicida de acción rápida para bovinos y ovinos.
- Asociación de 3 principios activos: Cipermetrina + Triclorfón + Butóxido de Piperonilo (BPO).
- Acción sinérgica de los activos por la presencia de BPO.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina	5,0 g
Triclorfón	30,0 g
Butóxido de Piperonilo	15 ml
Vehículo c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES
CIPERFON es una solución para uso por baño de aspersión (pulverización) en bovinos y ovinos, así como también para la fumigación de áreas comunes, compuesta por una poderosa asociación de Cipermetrina y Triclorfón, la cual es potenciada por la acción del Butóxido de Piperonilo (BPO), que actúa como sinergista de insecticidas y controla insectos resistentes, además de ser conocido por inhibir la bioactivación de insecticidas organofosforados; siendo una opción segura y eficaz en el tratamiento de bovinos y ovinos.

INDICACIONES
Indicado como garrapaticida y bernicida en el combate de larvas, ninfas, machos y hembras, evitando la puesta de huevos fértiles de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus,* de igual manera combate a *Damalinia bovis, Haematopinus eurysternus, Linognatus vituli* (piojos), *Chorioptes bovis* y *Psoroptes ovis* (sarna).
Además, tiene una excelente actividad sobre *Stomoxys calcitrans* (mosca del establo), mosca doméstica, *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos) y *Dermatobia hominis* (ura).
CIPERFON cuando es usado para fumigación de áreas comunes, actúa muy bien para combatir insectos, como cucarachas y pulgas que usualmente infestan galpones, cobertizos, establos y lugares de cría.

DOSIFICACIÓN
Debe aplicarse exclusivamente de manera externa en baños de aspersión (pulverización), después de una dilución previa en la proporción de 5,0 ml de producto por cada 2,0 litros de agua, usar de 3 a 5 litros por todo el cuerpo del animal.
Pulverización de instalaciones (fumigaciones) como: corrales, establos, lecherías, mataderos, granjas de cerdos, granjas avícolas y galpones; para estos casos, diluir 3,0 ml de **CIPERFON** por cada 2,0 litros de agua.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 7 días. **Leche:** 10 horas.

DESTINADO A:

Bovinos **Equinos**

Ovinos **Caprinos**

Caninos **Felinos**

PRESENTACIÓN
FRASCO CON
50 ml

Atropina CALBOS 1%

¡SULFATO DE ATROPINA 1%!

- Antídoto para intoxicaciones por organofosforados y antiespasmódico en medicación preanestésica.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Sulfato de Atropina	1 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Ejerce una acción inhibitoria sobre los órganos y sistemas inervados por los nervios colinérgicos. El mecanismo básico consiste en el antagonismo de la acetilicona. Antiespasmódico, se indica en las contracciones intestinales, uretrales y de vesícula, estimulante cardíaco y respiratorio, dilatador bronquial, intoxicación por organofosforados, antídoto de eserina, pilocarpina, morfina, aerocolina y cloroformo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Puede ser administrado por las vías:
Intramuscular, subcutánea y endovenosa.
Las dosis indicadas pueden ser modificadas o repetidas según criterio Médico.

DOSIS
La vía endovenosa debe ser administrada solo por el Médico Veterinario.

Bovinos y Equinos adultos: 8 a 10 ml.
Bovinos jóvenes: 3 a 5 ml.
Ovinos, Caprinos y Porcinos: 2 a 5 ml.
Caninos y Felinos: 0,1 ml a 0,5 ml.

TIEMPO DE RETIRO
No requiere.

DESTINADO A:

Vacunos

Ovinos

Caprinos

Camélidos

Búfalos

Porcinos

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE

50 ml - 200 ml y 500 ml

BOVIFORT EXP

¡MÁS GANANCIA DE PESO EN MENOR TIEMPO!

- Proporciona un mejor desarrollo porque estimula el metabolismo orgánico.
- De los productos más vendidos en Brasil para el engorde de ganado.
- Indicado después de enfermedades infecciosas o parasitarias.
- Previene la anemia, la fatiga y el estrés en general.
- Fórmula reforzada.

COMPOSICIÓN
Fórmula Practicada
Cada 100 ml contiene:

Vitamina B12 (Cianocobalamina)	20 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)	1,20 mg
Niacina	1,20 mg
Glicerofosfato de Sódio	1 g
Glicina	400 mg
L Leucina	200 mg
L Triptofano	50 mg
Arginina	200 mg
L Lisina	1 g
Acetil Metionina	200 mg
Histidina	200 mg
Valina	200 mg
Cloruro de Cobalto	15 mg
Hierro Dextrano	5 ml
Vehículo c.s.p.	100 ml

INDICACIONES

Es indicado para la suplementación de nutrientes directamente por vía inyectable, como reductor de estrés, estimulante de las funciones metabólicas, mejora el aumento de peso y como adyuvante en la recuperación del buen estado físico del animal.

Contiene en su formulación vitaminas, aminoácidos y minerales.

Es recomendado para la administración profiláctica en las diversas fases de la crianza, sobre todo después del tratamiento de enfermedades infecciosas o parasitarias.
Trata y previene la anemia, la fatiga y el estrés en general.

Estimula el metabolismo orgánico, proporcionando un mejor desarrollo del animal.
Es de aplicación intramuscular y subcutánea en ganado.

MODO DE USO

Parenteral: Por vía intramuscular o subcutánea.

DOSIS

Vacunos y Bufalinos: Hasta 150 kg: Aplicar 5,0 ml por dosis.
Más de 150 kg: Aplicar 10 ml por dosis.
Ovinos, Caprinos y Porcinos: APLICACIÓN SUBCUTÁNEA. Adultos: Aplicar de 5,0 ml por dosis.
Camélidos: APLICACIÓN SUBCUTÁNEA. Adultos: Aplicar de 5,0 ml por dosis.

Repetir el tratamiento cada 30 días o según las instrucciones del Médico Veterinario.

DESTINADO A:

Bovinos · Equinos · Ovinos · Porcinos

PRESENTACIÓN
FRASCO CON **500 ml +**
Equipo de 1.80 m con
Aguja en su extremidad

CALFOZ

SUPLEMENTO INYECTABLE DE CALCIO, FÓSFORO Y MAGNESIO

- Aplicación endovenosa.
- Altas concentraciones de Gluconato de Calcio.
- Proporciona rápida recuperación del animal debilitado.
- Tiene Fósforo para lograr una mejor absorción del Calcio.
- Alta eficiencia en las hipoglicemias, fiebre de la leche e intoxicaciones.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Gluconato de Calcio	20,0 g
Cloruro de Magnesio	6 g
Butafosfano Técnico	0,40 g
Dextrosa	5,00 g
Vehículo c.s.p.	100,0 ml

DOSIS
Equinos y Bovinos Adultos: 200 ml.
Potros, Becerros, Ovinos y Porcinos: 20 a 30 ml.
Lechones: 2 a 4 ml.
En general una única dosis es suficiente.
En los casos de Parálisis y Paresias referentes al parto, las dosis pueden ser repetida 2 a 3 veces al día, o a criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES
En Bovinos, Porcinos y Equinos que presenten paresia, parálisis y tetania originadas por la disminución del calcio en sangre (Hipocalcemia) antes, durante y después del parto, y durante la lactancia (Hipocalcemia Puerperal, Fiebre de la leche, Eclampsia Puerperal, Tetania de viaje, Calambres), Tetania del pasto; alteraciones del metabolismo mineral y acetonuria, además como coadyuvante en el tratamiento de raquitismo y osteomalacia. En Porcinos se recomienda solo por vía subcutánea.

DESTINADO A:

Bovinos · Ovinos · Porcinos

PRESENTACIÓN
FRASCO CON
50 ml y 100 ml

FERRON B-12

SOLUCIÓN INYECTABLE PARA LA SUPLEMENTACIÓN DEL HIERRO, CON VITAMINA B12 Y HIERRO DEXTRANO

- Combate las anemias ferropénicas.
- Prevención y curación de procesos anémicos.
- Hierro Dextrano 10% asociado con Vitamina B12.
- Ayuda en el tratamiento de la Tristeza en el Ganado.

COMPOSICIÓN
Cada ml contiene: Hierro Dextrano, equivalente a 100 mg

Hierro Elemental	500,0 mg	Vitamina B12	10,0 mcg
Fenol	5,0 mg	Vehículo Acuoso c.s.p.	1,0 ml

INDICACIONES
Indicado para la prevención y el tratamiento de anemias ferropénicas, especialmente en lechones recién nacidos. En todas las especies, se recomienda para el tratamiento de la anemia por la deficiencia de hierro originada por diversas causas: la falta de mineral en el alimento, defectos en la absorción del hierro a través de la babesiosis, seguido de un tratamiento específico.

DOSIS
- Para las anemias de los animales lactantes:
Lechones (del 3er. hasta el 7mo. día de vida): 1 a 2 ml.
Becerros (hasta 10mo. día de vida): 2 a 5 ml.
- Para el tratamiento de las Anemias Ferropénicas en todas las especies:
Bovinos Adultos: 10 ml.
Ovinos, Porcinos, Becerros: 5 ml.

Nota: Realizar una aplicación cada siete días. La duración del tratamiento dependerá del grado e intensidad de la anemia y bajo orientación de Médico Veterinario.

DESTINADO A:

Bovinos **Equinos** **Ovinos**

PRESENTACIÓN
FRASCO CON
100 ml y 200 ml

VIT ADE

SOLUCIÓN VITAMÍNICA INYECTABLE, COMPUESTA DE VITAMINAS A, D Y E

- Es el ADE más vendido en Brasil.
- Mejora los índices reproductivos.
- Produce aumento de peso.
- Fórmula equilibrada.

COMPOSICIÓN
Cada 100 g contiene:

Vitamina A (Palmitato)	4.000.000 UI
Vitamina D3	1.000.000 UI
Vitamina E	1.200 UI
Aceite Vegetal c.s.p.	100 ml

PROPIEDADES
Asociación de las vitaminas A, D3 y E en dosis equilibradas, que engloba la actividad de cada una en particular:
Vitamina A: Para mantener la estructura de los tejidos epiteliales y su funcionamiento normal; desempeña un papel en la formación del tejido y estructura ósea.
Vitamina D3: Es la vitamina antirraquítica, que previene la osteoporosis y osteomalacia al facilitar la absorción de Calcio y Fósforo en hueso.
Vitamina E: Regula los procesos de oxidación en el cuerpo, aumento de la fertilidad y es indicado para el tratamiento de la distrofia muscular.

DOSIS
Bovinos y Equinos (1 ml/50 kg de peso vivo):
Potros y Becerros: 2 ml de 15 en 15 días.
Animales de recría y engorde: 5 ml de 45 en 45 días.
Animales en gestación o lactación: 5 ml de 45 en 45 días.

Ovinos (1 ml/50 kg de peso vivo):
Fase de crecimiento: 1 ml de 30 a 30 días.
Reproductores: 2 ml de 30 a 30 días.

Nota: Las dosis pueden cambiar a criterio del Médico Veterinario.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
SUSPENSIÓN INYECTABLE
100 ml y 250 ml

CALBOS COMPLEX SEL

Vitaminas y Minerales

¡EL BALANCE IDEAL!

- Única microemulsión inyectable de Vitaminas y Minerales patentada, de fácil aplicación.
- Una combinación ideal balanceada de Vitaminas y Minerales.
- Avance científico en la formulación: Alta tasa de absorción con niveles probados en sangre e hígado a largo plazo.
- Contiene Selenometionina con mayor biodisponibilidad y menor citotoxicidad para un mejor almacenamiento a largo plazo y liberación de Selenio.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Vitamina E Acetato	5,00 g
Vitamina A Palmitato	1,38 g
Zinc (como Edetato)	1,00 g
Cobre (como Edetato)	0,375 g
Selenometionina	0,311 g
Manganeso (como Edetato)	0,250 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Complejo vitamínico y mineral para prevenir y tratar las deficiencias de Vitaminas A y E en unión con Selenometionina como molécula patentada, para una mayor biodisponibilidad y menor citotoxicidad así como: Zinc, Manganeso y Cobre en forma de Edetato (EDTA) que permite una mayor biodisponibilidad de los minerales que garantiza un efecto rápido y a la vez permite su almacenamiento en el hígado hasta 30 días luego de la administración del producto.

El producto está formulado específicamente para proteger el cuerpo en el intervalo posterior a la inyección, mientras que los minerales no unidos se incorporan a la sangre y se procesan a su forma funcional en la que son inofensivos para el cuerpo.
Esta formulación innovadora incluso mejora el potencial de absorción cuando se prueba con una combinación de minerales solubles en agua.

Las deficiencias micronutricionales solo pueden ser diagnosticadas por Profesionales.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Agitar bien el producto antes de usar.
Por inyección subcutánea solamente, aplicando las medidas de asepsia y antisepsia correspondientes a la administración de inyectables.

DOSIS
Recomendada: 1 ml cada 50 kg de peso.
Vacas: Pueden ser tratadas 2 a 4 veces por año, se recomienda 4 semanas antes del parto, 4 semanas antes del cruzamiento y 4 semanas antes del secado.
Toros: 2 a 3 veces por año.
Novillas: Cada 3 meses antes del cruzamiento.
Becerros: Al destete.

Se aconseja no cambiar este esquema de administración sin haber consultado un Técnico en Nutrición o a un Profesional Veterinario.

DESTINADO A:

Bovinos
(Adultos y Jóvenes Becerros)

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE MULTIMINERAL
100 ml y 500 ml

FOSFOSEL MINERAL

+ FERTILIDAD
+ PRODUCCIÓN
+ CRECIMIENTO

¡TU MEJOR ALIADO EN EL CRECIMIENTO Y LA REPRODUCCIÓN!

- Fósforo Inorgánico - Orgánico
- Selenio
- Potasio
- Magnesio
- Cobre

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Fosfato Monosódico (2H2O)	20,5%
Glicerofosfato de Sodio (5,5 H2O)	14%
Selenato de Sodio	0,24%
Cloruro de Magnesio (6 H2O)	2,5%
Hidróxido de Potasio	0,45%
Cloruro de Cobre (2 H2O)	0,088%
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES
Bovinos: Estados carenciales de fosfóro debido a deficiencias de aporte o trastornos del metabolismo Ca-P, astenias y fertilidad reducida, raquitismo, osteomalacia, crecimiento retardado y retención de placenta.
Terapia de ayuda en vacas caídas.

Acción: Corrector de deficiencias de fósforo.

El Magnesio, Selenio, Cobre y Potasio previenen importantes disfunciones como la tetania de la pastura, distrofias musculares y del sistema nervioso; deficiencias en sistemas enzimáficos relacionados con la utilización de la energía y con la eliminación de los radicales libres de la peroxidación de los ácidos grasos, además de la síntesis de hemoglobina y melanina.

DOSIS
Inyectable subcutáneo.
Bovinos adultos: 10 ml.
Bovinos jóvenes (Becerros): 5 ml.
El tratamiento se puede repetir a los 30 días.

TIEMPO DE RETIRO Carne: 20 días. **Leche:** 3 días.

Prueba EL IMPACTO de

FOSFOSEL MINERAL

INDICADO PARA:

LOS DESAFÍOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE VACAS LECHERAS

PREPARACIÓN DE TOROS PARA LA TEMPORADA DE MONTA

BOVINOS DE CARNE

EL PERIODO DE PREPARTO

NOVILLAS DE PRIMER SERVICIO

EL DESARROLLO Y LA FERTILIDAD DE LAS VACAS

TU MEJOR ALIADO
+ FERTILIDAD
+ PRODUCCIÓN
+ CRECIMIENTO

Multimineral Inyectable

Formulado con una doble fuente de Fósforo, con alta concentración del mismo en forma Orgánica e Inorgánica, que además contiene Selenio, Potasio, Magnesio y Cobre; combinación de minerales primordiales para:

- El desarrollo, crecimiento y mejorar la reproducción en los animales.
- Incrementar la fertilidad de hembras y machos del rebaño.
- Aumentar el número de partos en las hembras del rebaño.
- Disminuir la cantidad de días abiertos en las vacas.

LO QUE SE TRADUCE EN:

- **Menor desecho de vacas por infertilidad.**
- **Más becerros por vaca en menor tiempo.**

¿PARA QUÉ SE RECOMIENDA FOSFOSEL MINERAL?

El producto está indicado en Bovinos de Carne y Leche, como prevención y tratamiento de estados carenciales de Fósforo debido a deficiencias en el Aporte o Trastornos Metabólicos Ca-P, además de deficiencias de Selenio, Potasio, Magnesio y Cobre, y sus consecuencias tales como:

- » **Astenia**
- » **Fertilidad Reducida**
- » **Raquitismo**
- » **Osteomalacia**
- » **Crecimiento Retardado**
- » **Distrofia Muscular**
- » **Síndrome de Infertilidad Carencial**
- » **Retención de Placenta**
- » **Desórdenes Nerviosos**
- » **Tetania**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

- Aplicar estrictas medidas de asepsia.
- Puede provocar un ligero edema o inflamación en la zona de aplicación, que desaparece rápidamente.
- Consérvese en el envase original, cerrado perfectamente.
- Consérvese a no más de 30 °C, protegido de la luz solar directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DESTINADO A:

Bovinos

Equinos

Ovinos

Porcinos

PRESENTACIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE
250 ml y 500 ml

YODA-CAL

B_{12} + Ca + Se
Vit. B_{12} Calcio Selenio

¡COMBINACIÓN IDEAL DE

VITAMINA B12 + CALCIO + SELENIO + COBRE + COBALTO + HIERRO + IODO + FÓSFORO!

- Solución inyectable que aporta Vitamina y Minerales.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Gluconato de Calcio	1,87 g
Hipofosfito de Calcio	0,6 g
Edetato de Sodio y Cobalto $4H_2O$	1,25 g
Edetato de Sodio y Cobre	1,5 g
Edetato de Sodio y Hierro $3H_2O$	1,25 g
Edetato de Sodio y Manganeso	0,65 g
Edetato de Sodio y Zinc	0,1 g
Cloruro de Magnesio $6H_2O$	0,534 g
Ioduro de Potasio	0,1 g
Selenito de Sodio	0,02 g
Vit. B12 (como Hidroxicobalamina)	0,00015 g
Excipientes c.s.p.	100%

INDICACIONES
Está indicado para la prevención y tratamiento de estados carenciales de Cobre, Cobalto, Hierro, Iodo, Fósforo, Calcio, Magnesio y Manganeso. Aporta Selenio.

En casos de Hipocalcemia, Hipomagnesemia, Carencias de Fósforo, Osteodistrofias, Convalecencia, Debilidad, Bajo Peso, Preñez, Lactancia, etc.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Administrar vía parenteral, inyectable, subcutáneo o intramuscular.

DOSIS
Bovinos y Equinos:
2,5 ml por cada 100 kg de peso.

Ovinos:
3 ml (dosis total).

Porcinos:
5 ml (dosis total).

DESTINADO A:

Bovinos

Ovinos

Caprinos

Porcinos

Equinos

PRESENTACIÓN
SUSPENSIÓN
INYECTABLE
100 ml - 250 ml y 500 ml

CALVITASAN PLUS

CONTIENE ATP

¡MÁS QUE NUTRIENTES, ES ENERGÍA LO QUE TU GANADO NECESITA!

- Complemento Vitamínico Mineral en suspensión inyectable.

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml contiene:

Adenosin trifosfato (ATP)	0,652 g
Vitamina A palmitato	3.000.000 UI
Vitamina D3	1.000.000 UI
Vitamina E acetato (tocoferol)	1,000 g
Edetato de sodio y hierro	0,434 g
Selenometionina	0,150 g
Edetato de cobre	0,158 g
Edetato de zinc y sodio	0,160 g
Edetato de sodio y cobalto	0,103 g
Cloruro de magnesio hexahidrato	0,236 g
Yoduro de sodio	0,012 g
Gluconato de calcio monohidrato	1.230 g
Clorfeniramina maleato	2.000 g
Excipientes c.s.	100 ml

INDICACIONES
CALVITASAN PLUS Es un suplemento reconstituyente formulado con vitaminas y minerales que incluyen fosforo y selenio ideal para ganado de leche en sus distintas etapas productivas y reproductivas. Además, contiene ATP fuente de energía, para uso inyectable, indicado para mejorar los índices reproductivos en vacas de cría, vacas de leche y novillas. Está indicado en pre-servicio, mejora el porcentaje de celo, mayores porcentajes de preñez, mayor cantidad de terneros y mejor calidad de leche. Aplicado desde 3 semanas antes del parto aumenta el mecanismo de defensa post-parto, reduciendo los casos de retención de la placenta, metritis y mastitis.

VÍA DE APLICACIÓN - MODO DE EMPLEO
Vía intramuscular o subcutánea.

DOSIS
Bovinos:
2 ml cada 100 kg de peso. Vía intramuscular o subcutánea.

Equinos:
2 ml cada 100 kg de peso. Vía intramuscular únicamente.

Ovinos - Caprinos y Porcinos:
1 ml cada 15 kg de peso. Vía intramuscular únicamente.

Se recomienda repetir cada 15 días. En todos los casos deberá prevalecer el criterio del Médico Veterinario a cargo.

DESTINADO A:

Vacunos · Caprinos · Ovinos · Bufalinos

PRESENTACIÓN
ENVASES DE **10 kg**
CON BOLSAS DE **1 kg**

ADE CALBOV

SUPLEMENTO VITAMÍNICO Y MINERAL PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

- Para ser agregado en la ración o mezclado con sal mineral.
- Proporciona una mejor eficacia alimentaria en la cría.
- Ayuda en manutención productiva del ganado.
- 1 kg por cada 25 kg de Sal.
- Se administra por vía oral.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg del producto:

Vitamina A (Mín.)	10.000.000 UI/kg
Vitamina D (Mín.)	1.500.000 UI/kg
Vitamina E (Mín.)	3.500 UI/kg
Calcio (Mín.)	108 g/kg
Calcio (Máx.)	131 g/kg
Magnesio (Mín.)	9.700 mg/kg

INDICACIONES DEL PRODUCTO
Es un producto vitamínico mineral indicado para bovinos, caprinos y ovinos que proporciona una mejor eficacia alimentaria en la cría y manutención productiva de estas especies.

DOSIS
Administrar agregado oralmente a la ración o mezclado con sal mineral.
Vacunos y Bufalinos: 500 g por tonelada de ración o mezclado con la sal mineral en la proporción de 1:25.
Oveja y Cabras: Mezclado con la sal mineral en la proporción de 1:50.

DESTINADO A:

Vacunos · Caprinos · Ovinos · Bufalinos

PRESENTACIÓN
ENVASES DE **10 kg**
CON BOLSAS DE **1 kg**

ADE PHÓS CALBOV

SUPLEMENTO VITAMÍNICO Y MINERAL

- Mejora los índices de fertilidad y la conversión alimenticia.
- Vitaminas asociadas con Calcio y Fósforo.
- 1 kg por cada 25 kg de Sal.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg del producto:

Calcio (mín.)	180 g/kg
Calcio (máx.)	200 g/kg
Flúor (máx.)	576 mg/kg
Fósforo (mín.)	36 g/kg
Vitamina A (mín.)	10.000.000 UI/kg
Vitamina D (mín.)	1.500.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	3.500 UI/kg

INDICACIONES DEL PRODUCTO
Para prevenir y corregir los desequilibrios y deficiencias nutritivas de los rumiantes. Para mejorar el rendimiento y el índice de conversión.

DOSIS
Administrar agregado oralmente a la ración o mezclado con sal mineral.
Vacunos y Bufalinos: 500 g por tonelada de ración o mezclado con la sal mineral en la proporción de 1:25.
Oveja y Cabras: Mezclado con la sal mineral en la proporción de 1:50.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
ENVASES DE **10 kg**
EN BOLSAS DE **1 kg**

Allium + COMPLEJO MINERAL

¡PRODUCTIVIDAD SIN ESTRÉS!

- Repelente natural.
- Contiene Microelementos esenciales.
- Contiene 520 g de Ajo por kg.
- Mejora la conversión alimenticia.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg del producto:

Selenio (mín.)	200 mg/kg
Yodo (mín.)	800 mg/kg
Cobre (mín.)	13 g/kg
Cobalto (mín.)	400 mg/kg
Hierro (mín.)	5.000 mg/kg
Zinc (mín.)	10 g/kg

COMPOSICIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO
Yodato de Potasio, Selenio de Sodio, Sulfato de Cobalto Heptahidratado, Sulfato de Cobre Pentahidratado, Sulfato de Hierro, Sulfato de Zinc Monohidratado, Sabor Ajo, (BHT) Butil Hidroxi Tolueno y Caolín.

INDICACIONES
Suplemento mineral indicado en la prevención y corrección de carencias en microelementos minerales, mejorando la conversión alimenticia, favoreciendo la ganancia de peso y el aumento de la producción.
Repelente natural contra moscas.
Este producto debe ser mezclado con sal común en una proporción de 1:25.

MODO DE USO
En el suplemento mineral: Mezclar en sal blanca hasta lograr una mezcla uniforme en la proporción de 4% a 8% para la elaboración de suplementos minerales para bovinos, o sea 1 kg a 2 kg para cada 25 kg de sal blanca.

En la ración: Mezclar 1 kg del producto en 800 kg alimento (ej. ración, salvado, cereales, entre otros) a administrar al animal.

1- Este producto contiene solo microminerales, por lo tanto, cuando sea necesario, debe mezclarse con fuentes de Calcio, Fósforo y/o Cloruro de Sodio.
2- Consulte a un Profesional de confianza.

MODO DE CONSERVACIÓN
Conservar en local seco, ventilado y protegido de la luz solar directa.

DESTINADO A:

Porcinos

PRESENTACIÓN
ENVASE DE **20 kg**
EN BOLSAS DE **1 kg**

PATA NEGRA

¡NÚCLEO DE VITAMINAS • MINERALES Y AMINOÁCIDOS!

- Núcleo completo para la formulación de raciones.
- Aumento de peso con menos grasa.
- Mejora la conversión del alimento.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg de producto:

Calcio (mín.)	76 g/kg
Calcio (máx.)	90 g/kg
Cobalto (mín.)	85 mg/kg
Cobre (mín.)	1.000 mg/kg
Colina (mín)	4.000 mg/kg
Hierro (mín.)	7.000 mg/kg
Flúor (máx.)	420 mg/kg
Fósforo (mín.)	20 g/kg
Yodo (mín.)	33 mg/kg
Manganeso (mín.)	2.300 mg/kg
Metionina (mín.)	7.000 mg/kg
Niacina (mín.)	700 mg/kg
Sodio (mín.)	78 g/kg
Vitamina A (mín.)	220.000 UI/kg
Vitamina B1 (mín.)	500 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	1.000 mg/kg
Vitamina B5 (mín.)	400 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	500 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	500 µg/kg
Vitamina D3 (mín.)	100.000 UI/kg
Vitamina K (mín.)	200 mg/kg
Vitamina E (mín.)	400 UI/kg
Zinc (mín.)	3.300 mg/kg

INDICACIONES
Suplemento de minerales, vitaminas y aminoácidos para el equilibrio de raciones para cerdos, en las diferentes etapas de producción.

MODO DE USAR Y DOSIS
Uso oral.

Lechones en crecimiento, hembras en gestación y lactación, machos en reproducción: 2 kg por cada 100 kg de alimento, por día.

Animales en fase de terminación o engorde: Mezclar de 1,5 kg por cada 100 kg de alimento.

DESTINADO A:

Aves

PRESENTACIÓN
ENVASE DE **10 kg**
CON BOLSAS DE **1 kg**

CARIJÓ

¡NÚCLEO PARA AVES!

- Premezcla de vitaminas, minerales y aminoácidos.
- Premezcla completa para formulación de raciones.
- Mejora la conversión alimenticia.
- Aumenta la postura de huevos.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg de producto:

Calcio (mín.)	144 g/kg
Calcio (máx.)	171 g/kg
Colina (mín.)	10 g/kg
Metionina (mín.)	30 g/kg
Hierro (mín.)	5.000 mg/kg
Niacina (mín.)	5.000 mg/kg
Ácido pantoténico (mín.)	1.000 mg/kg
Ácido Fólico (mín.)	100 mg/kg
Vitamina E (mín.)	800 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	300 mg/kg
Vitamina K3 (mín.)	200 mg/kg
Vitamina B1 (mín.)	100 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	100 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	5.000 µg/kg
Vitamina A (mín.)	220.000 UI/kg
Vitamina D (mín.)	100.000 UI/kg
Lactobacillus acidophilus (mín.)	3,5×1011 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín.)	3,5×1011 UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (mín.)	3,5×1011 UFC/kg

INDICACIONES
CARIJÓ es una premezcla compuesta de vitaminas, minerales y aminoácidos enriquecida con probióticos para aves, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de crecimiento, mantenimiento y aumento de peso.
Premezclar antes de incorporar al volumen final del alimento.

MODO DE USAR Y DOSIS

- **Aves en Fase Inicial, Crecimiento y Engorde:**
  Administrar 1 kg de **CARIJÓ** por cada 100 kg de alimento.

- **Aves de Carne:**
  Administrar 1 kg de **CARIJÓ** por cada 100 kg de alimento.

- **Aves Ponedoras:**
  Administrar 1 kg de **CARIJÓ** por cada 80 kg de alimento.

DESTINADO A:

Aves

PRESENTACIÓN
BOLSAS DE **1 kg**

FARINHA DE CÁLCIO AVÍCOLA

¡SUPLEMENTO MINERAL PARA AVES!

- Polvo con tamaño de partícula ideal para el tracto digestivo de las aves.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg de producto:

Calcio (mín.)	300 g/kg
Calcio (máx.)	360 g/kg
Cloro (mín.)	31 g/kg
Fósforo (mín.)	18 g/kg
Flúor (máx.)	160 mg/kg
Magnesio (mín.)	8.000 mg/kg
Sodio (mín.)	19 g/kg

INDICACIONES
HARINA DE CALCIO AVÍCOLA es un complemento mineral para aves que contiene calcio, fósforo y otros minerales.

Mejora la calidad de la cáscara del huevo, previene el picoteo de los huevos y mejora la conversión alimenticia de las aves.

MODO DE USAR Y DOSIS
Administrar **HARINA DE CALCIO AVÍCOLA** pura o mezclada con la ración a razón de 2%; es decir, 2 kg por cada 100 kg de ración.

- **Pollos de Engorde o Ponedoras:**
  Administrar 0,5 g de **HARINA DE CALCIO AVÍCOLA** por ave y día.

- **Aves en Crecimiento:**
  Administrar 1 g de **HARINA DE CALCIO AVÍCOLA** por ave y día.

- **Aves Ponedoras:**
  Administrar 3 g de **HARINA DE CALCIO AVÍCOLA** por ave y día.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
ENVASE DE **10 kg**
EN BOLSAS DE **1 kg**

BOVIFORT®
LEITE

¡SUPLEMENTO MINERAL PARA GANADO!

- Mejora el aprovechamiento de los alimentos.
- Aumenta los índices de reproducción.
- Aumenta la producción y grasa de la leche.
- Contiene 6 probióticos.
- Contiene 1 prebiótico.
- Indicado para bovinas lecheras, especialmente en lactancia.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg del producto:

Bacillus cereus (CBMAI 988) (mín.)	$7x10^9$ UFC/kg
Cobre (mín.)	3.250 mg/kg
Cromo (mín.)	40 mg/kg
Enteroroccus faecium (CBMAI 924) (mín.)	$7x10^9$ UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (CBMAI 987) (mín.)	$7x10^9$ UFC/kg
Manano oligosacáridos (MOS) (mín.)	100 mg/kg
Ruminobacter amylophilum (CBMAI 927) (mín.)	$6x10^9$ UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (CBMAI 928) (mín.)	$6x10^9$ UFC/kg
Selenio (mín.)	40 mg/kg
Succionovibrio dextrinosolvens (CBMAI 929) (mín.)	$8,8x10^9$ UFC/kg
Vitamina A (mín.)	3.000.000 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	500.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	6.000 UI/kg
Zinc (mín.)	12,24 g/kg

INDICACIONES
Suplemento compuesto por vitaminas y microminerales con prebiótico y probióticos. Está indicado para ganado lechero, especialmente en lactación, promoviendo un aumento en la producción de leche y grasa; e índices reproductivos.
El probiótico está compuesto por bacterias beneficiosas que contribuyen para una mejora en la conversión alimenticia.
El manano oligosacárido (MOS) tiene la capacidad de modular el sistema inmunitario y la microbiota intestinal.

MODO DE EMPLEO
El producto puede consumirse puro o añadido a la ración.

Fase inicial (en los primeros 30 días): Añadir 500 g del producto a 100 kg de la ración.

A los 30 días: Añadir 100 g del producto a 100 kg de la ración.

La dosis individual para vacas es de 10 g a 40 g y para becerros de 5 g a 10 g.

DESTINADO A:

Bovinos de todas las edades

PRESENTACIÓN
ENVASE DE **10 kg**
EN BOLSAS DE **1 kg**

BOVIFORT® CORTE

¡SUPLEMENTO DE VITAMINAS Y AMINOÁCIDOS CON PREBIÓTICO Y PROBIÓTICOS!

- Mejora el aprovechamiento de los alimentos.
- Aumenta los índices de reproducción.
- Favorece el crecimiento y engorde.
- Contiene 6 probióticos.
- Contiene 1 prebiótico.
- Contiene aminoácidos.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg del producto:

Ácido fólico (mín.)	100 mg/kg
Bacillus cereus (CBMAI 988) (mín.)	$7x10^{10}$ UFC/kg
Colina (mín.)	20 g/kg
DL-Metionina (mín.)	30 g/kg
Enterococcus faecium (CBMAI 924) (mín.)	$7x10^{10}$ UFC/kg
L-Lisina (mín.)	20 g/kg
Lactobacillus acidophilus (CBMAI 987) (mín.)	$7x10^{10}$ UFC/kg
Manano oligosacáridos (MOS) (mín.)	100 mg/kg
Ruminobacter amylophilum (CBMAI 927) (mín.)	$6x10^{10}$ UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (CBMA1928) (mín.)	$6x10^{10}$ UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (CBMAI 929) (mín.)	$8,8x10^{10}$ UFC/kg
Vitamina B1 (mín.)	2.000 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	1.500 mg/kg
Vitamina B3 (mín.)	5.000 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	1.000 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	5.000 µg/kg
Vitamina C (mín.)	5.000 mg/kg

INDICACIONES
Suplemento vitamínico de aminoácidos con prebiótico y probióticos indicado para bovinos de todas las edades, especialmente para aquellos que participan en exposiciones y subastas, promoviendo una alta tasa de crecimiento, ganancia de peso, aumento de la resistencia biológica, reproducción y producción.
También ayuda en la recuperación de animales debilitados y estresados.
El probiótico está compuesto por bacterias beneficiosas que aportan una mejora en la conversión alimenticia y rápida adaptación de los becerros a la nueva dieta, por lo tanto se reduce el tiempo de finalización del ganado de carne.
El Manano oligosacárido (MOS) tiene la capacidad de modular el sistema inmunológico y la microbiota intestinal.

MODO DE EMPLEO
Debe administrarse por vía oral, puro o mezclado con la ración alimenticia del animal, siempre en el momento del tratamiento y para consumo inmediato.
Administrar diariamente.

Bovino adulto: 5 a 10 g por día.
Becerros: 10 a 15 g por día.
En la ración: Mezclar 2 kg por tonelada.

BOVIFORT® PROBIÓTICO

PASTA ORAL

DESTINADO A:

Bovinos

Ovinos

Caprinos

PRESENTACIÓN
JERINGA CON **35 g**

¡SUPLEMENTO VITAMÍNICO Y MINERAL PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL!

- Equilibrio de la microbiota ruminal e intestinal.
- Contiene Vitamina A, Vitamina D3 y Vitamina E.
- Ayuda con los trastornos digestivos.

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg del producto:

Cobre (mín.)	4,625 mg/kg
Cobalto (mín.)	300 mg/kg
Cromo (mín.)	20 mg/kg
Manganeso (mín.)	7,000 mg/kg
Selenio (mín.)	70 mg/kg
Zinc (mín.)	17 g/kg
Vitamina A (mín.)	3 500 000 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	7000 mg/kg
Vitamina E (mín.)	1500 UI/kg
Bacillus subtilis (mín.)	$6{,}3 \times 10^{11}$ UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (mín.)	$4{,}3 \times 10^{11}$ UFC/kg
Enterococcus faecium (mín.)	$4{,}3 \times 10^{11}$ UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín.)	$4{,}3 \times 10^{11}$ UFC/kg
Lactobacillus casei (mín.)	$4{,}0 \times 10^{11}$ UFC/kg
Lactobacillus lactis (mín.)	$2{,}0 \times 10^{11}$ UFC/kg

INDICACIONES
Bovifort Pasta Probiótica es un aditivo probiótico con vitaminas y minerales apto para bovinos, ovinos y caprinos. Contribuye al equilibrio de la microbiota ruminal e intestinal.

MODO DE EMPLEO
Administrar por vía oral a través de una jeringa dosificadora.

Becerros: Administrar 5 g del producto por vía oral para recién nacidos, repetir la dosis cada tres días, totalizando de dos a cuatro dosis o seguir la recomendación de un profesional capacitado.

Bovinos: Administrar 10 g del producto por vía oral, repetir la dosis 24 y 48 horas después de la primera aplicación.

Ovinos y caprinos jóvenes: Administrar 2,5 g del producto por vía oral a recién nacidos, repetir la dosis cada tres días, totalizando de dos a cuatro dosis o seguir la recomendación de un profesional capacitado.

Ovinos y Caprinos: Administrar 5 g del producto por vía oral, repetir la dosis a las 24 y 48 horas de la primera aplicación.

MODO DE EMPLEO

ETAPA	DOSIS	FRECUENCIA DE USO
Nacimiento	5 g	Día 0 - Día 3 - Día 6 - Día 9
Destete	5 g	2 Días antes del destete - Día 0 - Día 2 - Día 4
Periodo de cambio de pasto	5 g o 10 g	2 Días antes del intercambio de pasto - Día 0 - Día 2 - Día 4
Reposición de la microbiota ruminal e intestinal	5 g o 10 g	Día 0 - Día 1 - Día 2 - Día 3

Bovinos adultos: 10 g | **Becerros:** 5 g | **Caprinos y ovinos adultos:** 5 g | **Caprinos y ovinos jóvenes:** 2,5 g

DESTINADO A:

Equinos

PRESENTACIÓN
JERINGA CON
35 g

PROLIFE EQUI

¡PASTA ORAL A BASE DE VITAMINAS A, D, E y CROMO, CON PROBIÓTICOS!

COMPOSICIÓN
Niveles de garantía por kg del producto:

Glutamato Monosódico (mín.)	1.250 mg/kg
Cromo (mín.)	1.000 mg/kg
Lisina (mín.)	6.000 mg/kg
Metionina (mín.)	3.500 mg/kg
Vitamina A (mín.)	3.500.000 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	500.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.500 UI/kg
Bacillus subtilis (mín.)	$2{,}48 \times 10^8$ UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (mín.)	$2{,}48 \times 10^8$ UFC/kg
Enterococcus faecium (mín.)	$1{,}48 \times 10^8$ UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín.)	$3{,}47 \times 10^8$ UFC/g

INDICACIONES
Prolife Equi Pasta Probiótica es una pasta oral a base de vitaminas A, D, E y Cromo (Cr) en sus diferentes estados de desarrollo, enriquecida con probióticos.

Se usa en caballos, en el mantenimiento y recomposición de la microbiota intestinal tras el uso de antibióticos o quimioterápicos, situaciones de estrés, mejorando la digestión de los alimentos y la absorción de nutrientes.

El uso de probióticos tiene la función de prevenir la colonización de bacterias patógenas por competencia, mejorando la absorción de nutrientes y ayudando en la síntesis de vitaminas y proteínas.

MODO DE EMPLEO
Administrar por vía oral a través de una jeringa dosificadora.

Caballos adultos: 5 g / día.

Potros: 2 g / animal / día.

Glicocalbos 50

¡SOLUCIÓN DE DEXTROSA AL 50%!

- Energético de rápida absorción.
- Estimulante cardio-hepático y renal.
- Intoxicaciones en general.
- Diurético.

DESTINADO A:

Bovinos

Equinos

Ovinos

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE

500 ml

+

Equipo de 1.80 m con Aguja en su extremidad

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Dextrosa Anhidra	50,00 g
Vehículo c.s.p.	100,00 ml

INDICACIONES

La solución de dextrosa hipertónica es un compuesto dinamógeno.

En los casos de hipoglicemia, se encuentra en la Dextrosa, respuesta inmediata.

En solución hipertónica es tonicardiaca, diurética y posee alto poder energético, utilizado como antitóxico de elección.

PROPIEDADES

La dextrosa interviene en el metabolismo como factor energético, restaurando el equilibrio calórico, corrigiendo la insuficiencia hepático-cardio-renal como consecuencia de las toxinas recurrentes a toxiinfecciones.

VÍA DE APLICACIÓN

Vía inyectable. Para aplicación intravenosa lenta.

DOSIS

La dosis recomendada es de 1 ml del producto por kg de peso vivo.
Esa dosificación puede ser modificada a criterio del Médico Veterinario.

DESTINADO A:

Bovinos

PRESENTACIÓN
ENVASE DE
200 g

POMADA PARA ORDEÑO CALBOS

¡POMADA CON VITAMINA A, E y ACCIÓN ANTISÉPTICA !

COMPOSICIÓN
Cada 100 g contiene:

Aceite Mineral	5,00 g
Vaselina sólida	3,00 g
Vitamina A	0,05 g
Vitamina E	0,05 g
Cloruro de Benzalconio	0,10 g
Vehículo c.s.p.	100,00 g

INDICACIONES
Usada después del ordeño, evita la penetración de bacterias a través de la piel, previene grietas en los pezones y piel, tiene acción emoliente.

Indicada para hidratar los pezones y facilitar el ordeño manual, es una pomada cremosa a base de cloruro de benzalconio, Vitaminas A y E estas últimas tienen propiedades antioxidantes, que ayudan a prevenir los daños causados por los radicales libres, indicada para la higiene e hidratación de los pezones antes del ordeño. Tiene acción emoliente y lubricante.

MODO DE EMPLEO
Se recomienda utilizar una fina capa de **POMADA PARA ORDEÑO CALBOS** luego del ordeño (manual o mecánico).
Esta aplicación se hará posterior al lavado de la ubre y los pezones con el fin de cubrir toda la superficie, sobre todo en los pezones para evitar afecciones.

TU FINCA SANA CON CALBOS Saúde Animal

CALBOS SALUD ANIMAL

El éxito de **Laboratorios Calbos Ltda.,** se define en su avance y mejora continua, gracias a las innovadoras tecnologías que garantizan día a día la mejor calidad para el bienestar de los productores y la salud de los rebaños.

TU
FINCA
SANA
CON
CALBOS
Saúde Animal
Línea de Grandes Animales del
GRUPO
Suply Vet
MARCAS de
CALIDAD
Laboratorios CALBOS LTDA - VENEZUELA
calbosvzla
www.CALBOSVENEZUELA.com